

# Gotik

**Sulfato de zinc monohidrato 0,01 g**  
**Piridoxina clorhidrato 0,02 g**

**Loción**

**Antiséptico, Antiseborreico**

**Vía de Administración:** Tópica Ocular

## FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Sulfato de zinc monohidrato.....	0,01 g
Piridoxina clorhidrato.....	0,02 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Gotik Loción combina dos principios activos el **Sulfato de Zinc** y **Piridoxina Clorhidrato** que actúan por mecanismos de acción diferentes, pero complementarios. El **Sulfato de Zinc** tiene un efecto antiséptico. La **Piridoxina Clorhidrato** es un agente antiseborreico de acción prolongada.

También contiene Dehyton que es un tensioactivo anfótero derivado de la betaina, con actividad antimicrobiana, tiene alta compatibilidad con la piel y las mucosas, su característica anfotérica confiere al producto baja irritabilidad para los ojos.

Gotik Loción permite dejar una fina película sobre la piel con una concentración mayor de principios activos presentando una actividad mayor que otras formas farmacéuticas como las pomadas y cremas.

## INDICACIONES

Tratamiento tópico de la blefaritis, con acción antimicrobiana, antiséptico y antiseborreico para la limpieza del párpado en la blefaritis.

## POSOLOGÍA

Aplicar sin fricción en la región afectada una vez al día según criterio médico. Se debe aplicar una capa fina de la loción con un isopo, evitando el contacto con los ojos. En infecciones graves la aplicación deberá ser completada con la administración sistémica de un antibiótico adecuado.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación. Se debe evitar su uso prolongado e indiscriminado.

## REACCIONES ADVERSAS

Puede presentarse un ligero ardor local en el momento de su aplicación.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar únicamente por vía Tópica. El uso sistémico puede causar ocasionalmente toxicidad hematopoyética, pero raramente ocurre con la administración tópica. No se recomienda el uso prolongado de este medicamento.

## INTERACCIONES

No se conocen interacciones medicamentosas de los componentes de este medicamento.

## RESTRICCIÓN DE USO

Pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

## SOBREDOSIS

Gotik Loción está indicado para ser utilizado por vía externa, una vez al día solamente. Debido a las características del medicamento, no son de esperar efectos tóxicos con el uso tópico de este producto a la dosis recomendada. En caso de ingestión accidental debe considerarse un método apropiado de vaciamiento gástrico.

## CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

Una vez abierto el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo un frasco x 60 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.  
Teléfono: 220-418".

  
**Oftalmol**  
División de **INDUFAR CISA**  
Regente: Quim. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución:  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13