

CORTAGRIP



TÉ CALIENTE NOCHE

Paracetamol, Vitamina C, Pasiflora, Tilo,

Valeriana, Melisa

Polvo para Solución Oral

Analgésico, Antifebril, Antigripal, Sedante

Vía de administración: Oral

Fórmula

Cada 3 gramos contiene:

Paracetamol	500,00 mg
Vitamina C.....	300,00 mg
Pasiflora extracto seco.....	250,00 mg
Tilo extracto seco.....	20,00 mg
Valeriana extracto seco.....	120,00 mg
Melisa extracto seco.....	10,00 mg
Excipientes.....	c.s.p.

1. ¿Qué es Cortagrip Té Caliente Noche y para que se usa?

Es un medicamento analgésico, antipirético y sedante que favorece el reposo nocturno.

¿Qué necesita saber antes de utilizar CORTAGRIP TÉ CALIENTE NOCHE?

Debe administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o renal o anemia (en estos pacientes debe administrarse bajo supervisión y sólo durante períodos cortos).

El paracetamol debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de alcoholismo, ya que el riesgo de que se desarrolle o empeore el daño hepático es mayor en estos pacientes.

Pacientes con hipotensión arterial o patología cardiovascular deben tener precaución ya que el tilo podría determinar dilatación de los vasos sanguíneos y por tanto, disminuir la presión arterial. Este medicamento puede producir somnolencia. Puede disminuir la capacidad de reacción, por lo que no se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria peligrosa cuya utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.

“Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran”

No utilizar en caso de:

- si es alérgico a cualquiera de los componentes
- Niños menores de 12 años o si su peso es menor de 27 kg;
- si tiene intolerancia a la fructosa

Advertencias y precauciones

Cuando se está en tratamiento con algún medicamento para tratar la epilepsia debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

Los pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, deberán consultar con el médico antes de tomar este medicamento.

El uso frecuente de analgésicos durante mucho tiempo puede provocar o empeorar los dolores de cabeza. Si sufre de cefaleas crónicas y ha estado más de 3 meses tomando analgésicos, al menos en días alternos, no debe aumentar la dosis de analgésicos, sino consultar con su médico.

Interferencias con pruebas analíticas

Si le van a hacer alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, etc) comuníquese a su médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados.

Otros medicamentos y Cortagrip Té Caliente Noche

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, en particular, si está utilizando algunos de los siguientes medicamentos, ya que puede ser necesario modificar la dosis de algunos de ellos o la interrupción del tratamiento:

- Medicamentos para evitar coágulos en la sangre: anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina).
- Medicamentos para tratar la epilepsia: antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína u otras hidantoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamacepina).
- Medicamentos para tratar la tuberculosis: isoniazida, rifampicina
- Medicamentos para tratar la depresión y las convulsiones: barbitúricos (utilizados como hipnóticos, sedantes y anticonvulsivantes).
- Medicamentos para disminuir los niveles de colesterol en sangre: colestiramina.
- Medicamentos utilizados para aumentar la eliminación de orina: diuréticos del asa como los del grupo furosemida
- Medicamentos utilizados para el tratamiento de la gota: probenecid y sulfipirazona.
- Medicamentos utilizados para evitar náuseas y vómitos: Metoclopramida y domperidona.
- Medicamentos utilizados en el tratamiento de la tensión arterial alta (hipertensión) y las alteraciones del ritmo del corazón (arritmias cardíacas): propranolol.
- Alcohol etílico.
- Medicamentos básicos o ácidos: la administración de dosis altas de vitamina C puede disminuir la excreción de medicamentos ácidos y aumentar la excreción urinaria de medicamentos básicos
- Hierro: la vitamina C facilita la absorción del hierro en el tracto digestivo.
- Flucloxacilina (antibiótico): debido a un riesgo grave de alteración de la sangre y los fluidos (acidosis metabólica con alto desequilibrio aniónico) que debe ser tratada urgentemente y que puede ocurrir particularmente en caso de insuficiencia renal grave, sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en el sangre que da lugar a daño de órganos), desnutrición, alcoholismo crónico y si se utilizan las dosis máximas diarias de paracetamol.

Embarazo y Lactancia

Si está usted embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada, o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

El paracetamol pasa a la leche materna y existen limitados datos sobre el uso de altas dosis de vitamina C durante el embarazo y la lactancia, por lo que no se recomienda el uso de Cortagrip Té Caliente Noche, excepto bajo la indicación de un médico.

3. ¿Cómo se usa este medicamento?

Disolver el contenido del sobre en una taza de agua caliente.

Adultos y niños mayores de 12 años, 1 sobre disuelto al acostarse por la noche y si es necesario, el paciente puede repetir otra toma nocturna.

Siga correctamente el modo de empleo.

4. Posibles reacciones adversas

Efectos adversos raros que pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas: malestar, aumento de los niveles de transaminasas en sangre, reacción anafiláctica (incluyendo hipotensión), shock anafiláctico, hipersensibilidad y angioedema.

Efectos adversos muy raros que pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas: Enfermedades del riñón, orina turbia, dermatitis alérgica (erupción cutánea), ictericia (coloración amarillenta de la piel), alteraciones sanguíneas (agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, anemia hemolítica) e hipoglucemia (bajada de azúcar en sangre).

Efectos adversos con frecuencia desconocida: Púrpura, aceleración del ritmo cardíaco.

El paracetamol puede dañar el hígado cuando se toma en dosis altas o en tratamientos prolongados.

Dosis altas de vitamina C (por encima de 1g) puede provocar en determinados pacientes la formación de cálculos renales y puede aumentar la hemólisis en sujetos con deficiencia de G6PD en formas crónicas de hemólisis.

Se han observado sin frecuencia conocida: trastornos gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea), trastornos del sistema nervioso (mareo), trastornos del tracto urinario y del riñón (cromaturia y hiperoxaluria), trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (rash y urticaria).

5. ¿Qué ocurre si tomo una sobredosis?

En las primeras 24 horas, los síntomas de sobredosis de paracetamol incluyen: palidez, náuseas, vómitos, anorexia y dolor abdominal. El daño hepático es probable en adultos que han ingerido dosis de paracetamol iguales o superiores a 10 g. La raíz de valeriana en una dosis de aproximadamente 20 g causó síntomas tales como fatiga, dolor abdominal, tensión en el pecho, mareos, temblor en manos y midriasis, que desaparecieron dentro de las 24 horas siguientes. A pesar de la ausencia de síntomas precoces, la intoxicación aguda por paracetamol requiere hospitalización inmediata, en función del grado de intoxicación y del tiempo transcurrido, se le administrará tratamiento adecuado y medidas de apoyo (administración de acetilcisteína, vaciado gástrico, administración de carbón activado y/o hemodiálisis, diuresis forzada, etc.).

6. ¿Cómo conservar?

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Conservar en lugar seco y fresco.

7. PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 sobres con 3 g de polvo para solución oral.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

VENTA LIBRE EN FARMACIAS

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py