

APIRON

Metamizol 250 mg/5 mL

Jarabe
Analgésico - Antipirético

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada 5 mL de APIRON jarabe contiene:

Metamizol sódico.....250 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

APIRON jarabe proporciona acción: analgésica, antiinflamatoria, antipirética y antiflogística.

INDICACIONES

Cefaleas. Reducción de fiebre cuando otras medidas (como ser compresas frías) no resultan eficaces. Procesos reumáticos: artritis reumatoidea, osteoartritis o artrosis, fibrositis.

Dolores somáticos producidos por fracturas y proceso post-operatorio, y dolores espásticos intensos, agudos y crónicos.

POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio médico, debe administrarse según las siguientes indicaciones:

Niños pequeños

- De 1 a 3 años: (aprox. de 9 a 15 kg de peso corporal): 2,5 a 5 mL cada 4-6 horas.

Niños mayores

- De 4-6 años (aprox. de 16 a 23 kg. de peso corporal): 3,75 a 7,5 mL cada 4-6 horas.
- De 7 a 9 años (aprox. 24 a 30 kg de peso corporal): 5 a 10 mL cada 4-6 horas.
- De 10-12 años (aprox. de 31 a 45 kg de peso corporal): 7,5 mL a 15 mL cada 4-6 horas.
- De 13-14 años (aprox. de 46 a 53 kg de peso corporal): 8,75 mL a 17,5 mL cada 4-6 horas.

Adultos:

10 a 20 mL cada 4-6 horas.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones más comunes son las de hipersensibilidad que pueden llegar a producir trastornos por mecanismo inmunes, tales como agranulocitosis. Otra reacción esencial de hipersensibilidad es de shock, manifestándose con prurito, sudor frío y náuseas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Solo debe utilizarse bajo prescripción médica, durante los tres primeros meses y en las ultimas seis semanas del embarazo.

Comunicar al médico si padece de afecciones de las vías respiratorias y en caso de alteraciones previas del sistema hematopoyético.

CONTRAINDICACIONES

APIRON jarabe no debe administrarse en caso de alergia a las pirazolonas y en determinadas enfermedades metabólicas (porfiria hepática, déficit congénito de glucosa 6 fosfato - dehidrogenasa).

INTERACCIONES

Se produce disminución de la acción de la Ciclosporina al administrarse con Metamizol. Se potencian los efectos del Metamizol con la ingestión simultánea de alcohol.

SOBREDOSIS

Dolor abdominal, caída de la presión sanguínea, arritmias cardíacas, mareos, somnolencia, convulsiones.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento. El metabolito principal (4 - N - metilaminoantipirina) puede ser eliminado por hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión o filtración plasmática.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes con trastornos hematopoyéticos. Pacientes cuya tensión arterial fuera inferior a 100 mm Hg y los que se encuentren en situación de inestabilidad circulatoria.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 120 mL con vasito dosificador.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en las calles Gral. Santos c/ Manuel Domínguez.
Teléfono: 202-113".



**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13