

Acteril Salbutamol

Comprimidos 4 mg
Jarabe 2 mg/5mL

Broncodilatador selectivo con efecto tocolítico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULAS

Cada comprimido de ACTERIL 4 mg contiene:

Salbutamol (como Sulfato).....4 mg
Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de ACTERIL Jarabe contiene:

Salbutamol (como Sulfato).....2 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ACTERIL es un simpaticomimético selectivo Beta 2 estimulante con actividad específica sobre los receptores adrenérgicos de la musculatura lisa bronquial y uterina. A dosis terapéuticas produce broncodilatación con poco o ningún efecto cardíaco indeseable, mejorando rápidamente la capacidad ventilatoria pulmonar en cuadros clínicos dominados por el broncoespasmo. A nivel uterino por su efecto tocolítico tiene indicación en la amenaza de parto prematuro.

INDICACIONES

Está indicado en broncoespasmo de asma bronquial de todos los tipos, bronquitis crónica y efiséma. Por su efecto tocolítico está indicado en el tratamiento de los síntomas del parto prematuro durante el tercer trimestre del embarazo no complicado por condiciones de placenta previa, hemorragia parto o toxemia gravídica.

POSOLOGÍA

Adultos: Para casos moderados o severos, se recomienda la dosis habitual de 1 comprimido de ACTERIL 4 mg (equivalente a 10 mL de jarabe) tres o cuatro veces al día. De no obtenerse una broncodilatación adecuada, puede aumentarse gradualmente la dosis simple a 8 mg. En casos leves, 1/2 comprimido (equivalente a 5 mL de jarabe) tres a cuatro veces al día. Como útero inhibidor se aconseja iniciar el tratamiento con 1/2 comprimido cada 8 horas; de no obtener respuestas satisfactorias a esta dosis, se puede aumentar a 1 comprimido cada 8 horas, según criterio médico.

Niños: de 2 a 6 años se recomienda 2,5 a 5 mL de ACTERIL jarabe (1 a 2 mg) tres a cuatro veces al día. De 6 a 12 años: 5 mL = 2 mg o 1/2 comprimido tres a cuatro veces al día. En niños mayores de 12 años, 2 a 4 mg con igual frecuencia.

REACCIONES ADVERSAS

Temblores finos del músculo esquelético, usualmente las manos son las más afectadas. Este efecto depende de la dosis y es común para todos los estimulantes beta-adrenérgicos. Podrían presentarse también cefaleas y reacciones de hipersensibilidad incluídas angioedema, urticaria, broncoespasmos, hipotensión y colapso. Pueden ocurrir irritación de la boca y garganta. Algunos pacientes pueden presentar taquicardia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No se aconseja el uso de ACTERIL en el primer trimestre del embarazo. La administración previa al parto puede alterar el trabajo uterino. Evitar la prescripción de ACTERIL en forma simultánea a drogas betabloqueantes. Administrar con precaución en pacientes con hipertiroidismo.

EFFECTOS COLATERALES

En algunos pacientes se describen temblor fino de manos y sensación de tensión debido a la acción del **Salbutamol** sobre los músculos esqueléticos, dependiendo de la dosis y siendo éste un efecto común a todos los estimulantes beta-adrenérgicos. En dosis elevadas puede existir un incremento de la frecuencia cardíaca compensatoria a una vasodilatación periférica. Ocasionalmente se han referido cefaleas.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad al **Salbutamol**. Además no debe ser administrado durante el primer o segundo trimestre del embarazo.

INTERACCIONES

El uso simultáneo de antidepresivos tricíclicos puede potenciar la acción del **Salbutamol**. Administrado concomitantemente con los glucósidos digitálicos puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas. Los bloqueantes Beta-adrenérgicos antagonizan el efecto broncodilatador Beta-2-adrenérgico del **Salbutamol**. Inhibidores de la monoamino-oxidasa (MAO) puede potenciar la acción del **Salbutamol**. Hidrocarburos anestésicos por inhalación tales como: Cloroformo, Ciclo-propano, Halotano, pueden aumentar el riesgo de arritmias ventriculares al utilizarse con **Salbutamol**.

SOBREDOSIS

Latidos ectópicos ventriculares y supraventriculares, hipopotasemia, pirois, calambres y contracciones musculares, sofocos.

TRATAMIENTO

Suspender el medicamento. Administrar un bloqueante Beta-adrenérgico cardioselectivo para las arritmias cardíacas el cual debe administrarse con precaución. Mantener un intercambio respiratorio adecuado. Proporcionar apoyo cardíaco y respiratorio, según las necesidades. Control clínico estricto.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y lactancia. A menos que el médico tratante valore que el beneficio esperado para la madre sea mayor que el riesgo potencial para el feto.

CONSERVACION

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

Cajas x 20 comprimidos de 4 mg.
Frascos x 120 mL de jarabe.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quim. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535