

# ANEURIT

## Bromazepam

**Ansiolítico**

**Comprimidos 3 mg - 6 mg**

**Vía de Administración: Oral**

### FÓRMULAS

Cada comprimido celeste contiene:

Bromazepam ..... 3 mg  
Excipientes ..... c.s.

Cada comprimido amarillo contiene:

Bromazepam ..... 6 mg  
Excipientes ..... c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

El **Bromazepam** es un tranquilizante menor del grupo de las Benzodiazepinas. Su estructura molecular esta compuesta por dos anillos benzénicos acoplados a un anillo diazepínico y un átomo de bromo en uno de los anillos benzénicos. Posee acción ansiolítica e hipnótico-sedante. Su mecanismo de acción está relacionado con su unión a un sitio determinado del receptor de GABA (Ácido gamma aminobutírico), que es uno de los mayores neurotransmisores inhibitorios del cerebro.

### INDICACIONES

Ansiedad, angustia, obsesión, compulsiones, fobias e hipocondrías. Tratamiento de las reacciones emocionales provocadas por situaciones conflictivas y de estrés. Psiconeurosis, neurosis de ansiedad con síntomas depresivos. Tratamiento coadyuvante de los trastornos funcionales de los aparatos cardiovascular, respiratorio o gastrointestinal y genitourinario.

### POSOLOGÍA

Pacientes en tratamiento ambulatorio: 1,5 mg tres veces al día. Casos graves: de 3 mg a 12 mg, dos o tres veces al día. Las dosis recomendadas son aproximadas y deben ser adaptadas a cada caso. Al cabo de 3 a 6 semanas, según la evolución, es posible reducir en forma lenta la dosificación para con posterioridad suspender el tratamiento.

### REACCIONES ADVERSAS

Se tolera bien. La ataxia y la somnolencia que ocasionalmente pueden presentarse en pacientes debilitados o de edad avanzada desaparecen al reducir la dosificación. Su suspensión puede causar inquietud, ansiedad e insomnio.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No se recomienda interrumpir el tratamiento en forma brusca sino de manera gradual. Los pacientes deberán evitar la ingestión de alcohol. El **Bromazepam** puede modificar las reacciones del paciente (habilidad para conducir, conductas) de forma variable según la dosis empleada, la administración y la idiosincrasia individual.

### CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las Benzodiazepinas. Miastenia gravis. Insu-

ficiencia hepática y renal. Embarazo, lactancia. Enfermedad obstructiva crónica grave.

### INTERACCIONES

El uso simultáneo de otros depresores del S.N.C. como neurolepticos, tranquilizantes, antidepresivos, hipnóticos, analgésicos y anestésicos, pueden incrementar el efecto sedante del **Bromazepam**.

El efecto sedante del **Bromazepam** puede también incrementarse con Cisaprida. El Propanolol puede inhibir el metabolismo del **Bromazepam**.

### SOBREDOSIS

Confusión continua. Náuseas y vómitos. Somnolencia intensa. Latidos cardíacos disminuidos, sensación de falta de aire. Habla balbuceante continua y tambaleo.

### TRATAMIENTO

Si el paciente esta consciente debe inducirse la emesis mecánica y si está inconsciente el lavado gástrico. Si la respiración está deprimida se debe administrar oxígeno. Monitorizar el pulso y la presión arterial.

### RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y Lactancia.

### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

### PRESENTACIONES

Caja con 50 comprimidos celestes de ANEURIT 3 mg.

Caja con 50 comprimidos amarillos de ANEURIT 6 mg.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Bajo Receta Simple Archivada



"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

 **LABORATORIOS  
INDUFAR**  
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13