

# BECODAL

Dipirona

Dextrometorfan  
Clorfeniramina

Jarabe

Antigripal - Antifebril

Antihistamínico - Antitusivo

Via de Administración: Oral

## FÓRMULA

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Dipirona.....	250,000 mg
Dextrometorfan HBr.....	5,000 mg
Clorfeniramina Maleato.....	0,525 mg
Excipientes.....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

BECODAL jarabe es una especialidad farmacéutica compuesta por diversos fármacos que remiten con rapidez la sintomatología de los cuadros gripales, alérgicos y broncopulmonares agudos, reduciendo la fiebre y dolores musculares (**Dipirona**), atenuando la tos que acompaña normalmente a los cuadros gripales (**Dextrometorfan**). La **Clorfeniramina** le confiere propiedades antialérgicas.

## INDICACIONES

Está indicado en casos de gripe, tos, resfrío, catarro, bronquitis, estados alérgicos.

## POSOLOGÍA

**Niños menores de 1 año:** 1,25 mL, cada 4 - 6 horas.

**Niños de 1 a 6 años:** 2,5 mL, cada 4 - 6 horas.

**Niños mayores de 6 años:** 5 mL, cada 4 - 6 horas.

**Adultos:** 10 mL, cada 4 - 6 horas.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación.  
Pacientes hipersensibles a las pirazolonas y que presenten porfiria hepática, déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Inflamaciones del tracto gastrointestinal, de las vías biliares o insuficiencia hepática.

## REACCIONES ADVERSAS

Con incidencia muy rara pueden aparecer náuseas, vómitos, gastrálgias, somnolencia, mareos, confusión.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingesta de alcohol y otros depresores del SNC. Puede inhibir la lactancia por los efectos antimuscarínicos de la **Clorfeniramina** presente en la formulación. No es aconsejable el uso de la **Dipirona** en condiciones crónicas. La administración de este producto debe realizarse bajo estricta vigilancia médica.

## INTERACCIONES

Los medicamentos depresores del SNC pueden potenciar el efecto del **Dextrometorfan** y **Clorfeniramina**.

Los IMAO al administrarse en simultáneo con **Dextrometorfan** pueden producir excitación, hipotensión.

## SOBREDOSIS

Mareos, anorexia, visión borrosa, nerviosismo, inquietud o irritabilidad no habituales, náuseas, vómitos.

## TRATAMIENTO

Administración de carbón activado y sorbitol para el lavado gástrico. Oxígeno y líquidos intravenosos. No administrar estimulantes por que pueden producir crisis convulsiva.

## RESTRICCIONES DE USO

Evaluar riesgo/beneficio para administrar durante el primer trimestre del embarazo y en sus últimas semanas.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco con 120 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13