

# BRONALAR

Dextrometorfano - Fenilefrina  
Clorfeniramina

Descongestivo - Antitusivo - Antialérgico

Jarabe

Vía de administración: Oral

## FÓRMULA

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Dextrometorfano HBr .....	10mg
Fenilefrina HCl .....	5mg
Clorfeniramina maleato .....	2mg
Excipientes .....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

BRONALAR contiene **Dextrometorfano**, eficaz inhibidor del reflejo de la tos, útil en el tratamiento de la tos improductiva.

La **Fenilefrina** es un descongestivo de la mucosa rinofaríngea, de acción rápida y prolongada.

Por último, contiene **Clorfeniramina**, antihistamínico de escasa acción sedante.

## INDICACIONES

Está indicado en los procesos agudos y crónicos del tracto respiratorio tales como: gripe, resfriado, sinusitis, rinitis, laringitis, bronquitis, tos del fumador, tos seca.

## POSOLOGÍA

**Niños menores:** 2,5 mL 3 - 4 veces al día.

**Niños mayores:** 5 mL 3 - 4 veces al día.

**Adultos:** 15 mL 3 - 4 veces al día.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación.  
Pacientes con asma aguda. Disfunción hepática. Bradicardia. Embarazo.

## REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse cefalea, palpitaciones, vómitos, gastralgias, somnolencia.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La **Fenilefrina** presente en la formulación al ser utilizada durante el periodo final del embarazo puede ocasionar bradicardia fetal por aumento de la contractibilidad uterina.

Evitar la ingesta de alcohol u otros depresores del SNC durante la administración del medicamento.

La administración de este producto debe realizarse bajo estricta vigilancia médica.

## INTERACCIONES

El uso simultáneo de alcohol o medicamentos que producen depresión del SNC con **Clorfeniramina** puede potenciar los efectos depresores sobre el SNC.

Pueden bloquear la respuesta presora de la **Fenilefrina** los medicamentos bloqueantes como Alopurinol, Fenotiazina.

Los IMAO en simultáneo con **Dextrometorfano** pueden producir excitación, hipotensión e hiperpirexia.

## SOBREDOSIS

Confusión, nerviosismo, mareos, dolor de estómago, rash cutáneo.

## TRATAMIENTO

Lavado gástrico con solución de Cloruro de Sódico isotónico. Oxígeno. Administración de líquidos intravenosos. No administrar estimulantes ya que pueden producir crisis convulsivas.

## RESTRICCIONES DE USO

Uso Profesional.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco con 120 mL de BRONALAR Jarabe.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta bajo receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.  
Teléfono: 220-418".

**LABORATORIOS  
INDUFAR**  
División de **INDUFAR CISA**  
Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13