

# BRONCOFAR NF

**Gliceril Guayacol Éter - Clorfeniramina Maleato  
Salbutamol Sulfato**

**Jarabe - Comprimidos ranurados**

**Expectorante - Antihistamínico - Broncodilatador**

**Vía de Administración: Oral**

## FÓRMULA

Cada 5 mL contiene:

Gliceril Guayacol Éter.....	100 mg
Clorfeniramina Maleato.....	2,10 mg
Salbutamol (Salbutamol Sulfato).....	2 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada comprimido ranurado contiene:

Gliceril Guayacol Éter.....	100 mg
Clorfeniramina Maleato.....	2 mg
Salbutamol (Salbutamol Sulfato).....	2 mg
Excipientes.....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

BRONCOFAR NF es una asociación medicamentosa que contiene en su fórmula **Gliceril Guayacol Éter, Clorfeniramina Maleato y Salbutamol**.

La asociación de **Gliceril Guayacol Éter, y Salbutamol** le confiere propiedades para aliviar y/o prevenir los diferentes procesos respiratorios infecciosos o inflamatorios que cursen con broncoespasmos y presencia de secreciones densas, viscosas o de difícil eliminación. La **Clorfeniramina** (antihistamínico de los receptores H1) es un eficaz antialérgico que tiene una baja incidencia de efectos colaterales.

## INDICACIONES

BRONCOFAR NF está indicado para aliviar la sensación de la falta de aire, las sibilancias y la disnea asociadas al asma, mejorando la función pulmonar. Como expectorante, para el alivio sintomático de la tos debida a resfriados y a infecciones menores de las vías respiratorias superiores y donde es necesaria la fluidificación de las secreciones. También es útil en la rinitis alérgica perenne y estacional o rinitis vasomotora que suelen acompañar a estos problemas respiratorios.

## POSOLOGÍA

Este medicamento se administra por vía oral. Agítese bien antes de usar. La dosis se ajustará al criterio del médico y a las características del cuadro clínico. Como orientación se aconseja:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL, 2 - 3 veces al día.

Niños mayores de 6 años: 5 mL, 2 - 3 veces al día.

Niños menores de 6 años: 2,5 mL, 2 - 3 veces al día.

Broncofar NF Comprimidos Ranurados:

Niños: ½ comprimido 2 a 3 veces al día.

Adultos: 1 comprimido 3 a 4 veces al día.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación. Asma aguda. Embarazo. Lactancia.

## REACCIONES ADVERSAS

Nauseas, vómitos, diarrea, diuresis aumentada, cefalea mareo y nerviosismo. Taquicardia sinusal, extrasístoles aisladas y crisis convulsivas.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión concomitante de alcohol u otros depresores del SNC. En niños mayores puede producir hiperexcitabilidad. En pacientes de edad avanzada pueden aparecer mareos, sedación, confusión, hipotensión y son más sensibles a los efectos antimuscarínicos (sequedad de boca y retención urinaria).

Si produce somnolencia, evitar el uso de maquinarias peligrosas y manejo de vehículos. Debe administrarse con precaución a pacientes con arritmias preexistentes (la situación puede exacerbarse).

**Salbutamol** ha producido en raras ocasiones reacciones de hipersensibilidad con

rash, urticaria, angioedema o broncoespasmo.

**Embarazo:** Un análisis encontró correlación entre uso de **Gliceril Guayacol Éter** durante el primer trimestre del embarazo y aumento de la incidencia de hernia inguinal en el feto/recién nacido. Otros informes no han demostrado este riesgo ni ningún otro. Usar si los beneficios para la madre superan los posibles riesgos para el feto. **Lactancia:** No administrar a la madre lactante a menos que los beneficios potenciales para ella, justifique los riesgos en el lactante.

## INTERACCIONES

El uso simultáneo con medicamentos depresores del SNC o consumo de alcohol puede potenciar los efectos depresores de la Clorfeniramina.

Con respecto al **Gliceril Guayacol Éter** no se han descrito hasta el momento interacciones con otros medicamentos.

El uso simultáneo de alcohol o medicamentos que producen depresión del SNC con **Clorfeniramina** puede potenciar los efectos depresores sobre el SNC de estos medicamentos o de los antihistamínicos.

Con el uso simultáneo de anticolinérgicos u otros medicamentos con acción anticolinérgica con **Clorfeniramina** pueden potenciarse los efectos anticolinérgicos. El uso simultáneo de los MAO con la **Clorfeniramina** puede prolongar e intensificar los efectos anticolinérgicos y depresores del SNC de los antihistamínicos.

El uso simultáneo de medicamentos ototóxicos con antihistamínicos puede enmascarar los síntomas de ototoxicidad, como zumbido de oídos, mareos o vértigo.

Los bloqueadores beta-adrenérgicos como el propranolol antagonizan los efectos del **Salbutamol**.

La administración con aminas simpaticomiméticas puede incrementar los efectos cardiovasculares. La administración conjunta de **Salbutamol** con diuréticos de asa o tiazidicos pueden aumentar el riesgo de aparición de cambios electrocardiográficos o hipokalemia.

## SOBREDOSIS

Se observan síntomas como: latidos cardiacos, aumento de sudoración, mareos, dolor de estómago, respiración dificultosa, sequedad de boca, nariz o garganta.

## TRATAMIENTO

Realizar lavado gástrico y tratamiento sintomático.

## RESTRICCIÓN DE USO

Evaluar riesgo/beneficio en pacientes con problemas cardiovasculares, gastritis, úlcera péptica activa, enfermedad hepática.

## PRESENTACIONES

Caja conteniendo 1 frasco x 120 mL con vasiso dosificador.

Caja conteniendo 20 comprimidos ranurados.

## CONSERVACIÓN

Broncofar NF Jarabe: Conservar a temperatura no mayor a 30° C.

Broncofar NF Comprimidos Ranurados: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15 y 30° C.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta bajo receta

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py