Benzidol

Ibandronato 150 mg

Regulador del Calcio Óseo

Comprimidos Revestidos

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA
Cada comprimido revestido contiene:
Ácido Ibandrónico (como Ibandronato sódico).....150 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
El **Ibandronato** es un bifosfonato, inhibidor de la actividad osteoclástica del tejido óseo sin influir directamente en la formación del hueso.
Su mecanismo de acción está basado en la afinidad del **Ibandronato** por la Hidroxiapatita que forma parte de la matriz del hueso. El grado de absorción de **Ibandronato** se altera cuando se toma junto con alimentos o bebidas. La biodisponibilidad disminuye casi en un 90% si **Ibandronato** se administra con un desayuno habitual y no en ayunas. La unión a proteínas plasmáticas es del 85% - 87%. La fracción absorbida de **Ibandronato** desaparece de la circulación a través de su unión al hueso (40 - 50% en mujeres post-menopáusicas.) y el resto se elimina inalterado por la orina.

INDICACIONES
El **Ibandronato** es un bifosfonato, eficiente inhibidor de la resorción ósea. Utilizado como sal sódica en hipercalcemia maligna, para la prevención de fracturas y complicaciones en los huesos en pacientes con cáncer de mamas y metástasis ósea. Tambien para el tratamiento y prevención de la osteoporosis post-menopáusicas.

POSOLOGÍA
Tomar una vez al mes, preferiblemente el mismo día de cada mes, después del ayuno mínimo nocturno de 6 horas.
Administrar el medicamento 1 hora antes del desayuno, o bebida distinta del agua o de cualquier otro medicamento o suplemento oral.
Tomar con un vaso de 180 a 240 mL de agua de canilla (no agua mineral), en posición sentada o de pie. No acostarse hasta 1 hora después de la administración.

REACCIONES ADVERSAS
Generales: Sindrome gripal
Cardiovasculares: Hipertensión.
Gastrointestinales: dispepsia, náuseas, diarrea, constipación, dolor abdominal
Musculoesqueléticos: artralgias, dolor lumbar, dolor en las extremidades, osteoartritis localizada, mialgias, calambres musculares.
Infecciosas: estado gripal, nasofaringitis, bronquitis, infección urinaria, infección del tracto respiratorio superior.
Sistema Nervioso: cefaleas, vértigo, insomnio.
Dermatológicos: rash.
Se han descripto uveítis y escleritis con uso de bifosfonatos, en general.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El aporte suficiente de Calcio y Vitamina D es esencial para todas las pacientes. Los bifosfonatos se han asociado con disfagia, esofagitis y úlceras esofágicas o gástricas. Por lo tanto, las pacientes con antecedentes de prolongación del tránsito esofágico habrán de prestar especial atención y cumplir las instrucciones posológicas. Las pacientes deben ser instruidos para interrumpir el tratamiento y acudirán al médico si aparecen síntomas de irritación esofágica del tipo de disfagia reciente o progresiva, dolor con la deglución, dolor retroesternal o ardor de estómago.
Como los AINEs y los bifosfonatos se asocian con irritación gastrointestinal, se recomienda tener precaución cuando se administren concomitantemente.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a **Ibandronato** o a algún componente de la fórmula.
Hipocalcemia no corregida. Incapacidad para pararse o sentarse erecto durante 60 minutos.

INTERACCIONES
La biodisponibilidad oral de **Ibandronato** disminuye en general con la ingesta concomitante de alimentos. Es muy probable que los suplementos de Calcio, los antiácidos y otros medicamentos que contienen cationes multivalentes (como aluminio, magnesio y hierro) o vitaminas dificulten la absorción de **Ibandronato.**
Las interacciones metabólicas son poco probables, puesto que **Ibandronato,** no inhibe las isoenzimas principales del citocromo P450.

SOBREDOSIS
Hipocalcemia, hipofosfatemia y transtornos digestivos como son dispepsia, esofagitis, gastritis o úlcera.

TRATAMIENTO
Se puede administrar leche o antiácidos. No se debe provocar el vómito por el riesgo de esofagitis

RESTRICCIONES DE USO
Se recomienda no utilizar el producto durante el embarazo y la lactancia.

CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25ºC. Variación admitida entre 15º y 30ºC.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 1 comprimido revestido.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13