

Banes 600 AS

Ibuprofeno 600 mg

Comprimidos Revestidos de Acción Sostenida

Antiinflamatorio - Analgésico - Antipirético
de acción sostenida

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido de acción sostenida de BANES 600 AS contiene:

Ibuprofeno.....600 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

El **IBUPROFENO** actúa inhibiendo la actividad de la enzima ciclo-oxigenasa, dando lugar a una disminución de la formación de precursores de las prostaglandinas y de los tromboxanos a partir del ácido araquidónico. Su efecto antipirético se relaciona además con su acción a nivel de hipotálamo y una mayor disipación de calor a expensas de vasodilatación y aumento de flujo sanguíneo. Se absorbe por vía oral en forma rápida, pero los alimentos disminuyen la velocidad de absorción. Su unión a las proteínas plasmáticas es muy alta (98%) y se metaboliza en el hígado. El tiempo hasta alcanzar su efecto máximo es de 1 a 2 horas. Biotransformación hepática y eliminación renal.

INDICACIONES

BANES 600 AS está indicado en todos los procesos que cursan con dolor, inflamación y/o fiebre, solo o en combinación con otros fármacos. Afecciones inflamatorias y dolorosas de tejidos blandos, osteoartritis, artritis reumatoidea, dismenorrea, procesos bacterianos o virales que cursan con dolor e inflamación, como amigdalitis, cuadros gripales, faringitis, bronquitis, sinusitis, etc. Artrosis de rodilla, artrosis de cadera, traumatismos, abscesos, contusiones, fracturas, luxaciones, esguinces, afecciones musculoesqueléticas, síndromes radiculares, lumbociatalgias, artrosis cervical, lumbosacra, etc.

POSOLOGÍA

Adultos: La posología recomendada es de 2 a 4 comprimidos diarios, según la intensidad del dolor y el cuadro a tratar. Habitualmente se aconseja tomar 1 comprimido después del desayuno, almuerzo y cena hasta conseguir la remisión de los síntomas y signos y luego continuar con 1 o 2 comprimidos diarios con las principales comidas por el tiempo que el médico juzgue necesario. No superar los 3.200mg/día.

REACCIONES ADVERSAS

Epigastralgias, pirosis, diarrea, vómitos, dolor abdominal, rash, agranulocitosis, mareos, disminución del apetito y trombocitopenia. La administración a largo plazo de dosis elevadas, puede provocar en raras ocasiones alteraciones del SNC como dolor de cabeza, mareos, insomnio, irritabilidad y fatiga. Después de un tratamiento prolongado se puede presentar hepatotoxicidad, efectos secundarios gastrointestinales o de efectos ulcerogénicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con cuidado a pacientes con hemofilia u otros problemas hemorrágicos, ya que la inhibición de la agregación plaquetaria aumenta el riesgo. Puede producir ulceración o hemorragias gastrointestinales. En presencia de úlcera péptica, colitis ulcerosa o enfermedad del tracto gastrointestinal superior, puede aumentar el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales o ulcerogénicos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la droga, síndrome de pólipos nasales, angioedema o broncoespasmo frente a la Aspirina u otros AINEs. Asma bronquial. Embarazo o lactancia.

INTERACCIONES

El uso simultáneo con Paracetamol puede aumentar el riesgo de efectos renales adversos. La administración junto con corticoides o alcohol aumenta el riesgo de efectos gastrointestinales secundarios. El uso junto con hipoglucemiantes orales o Insulina puede aumentar el efecto hipoglucémico de éstos. La asociación con Probenecid puede disminuir su excreción y aumentar la concentración sérica potenciando su eficacia o aumentando el potencial de toxicidad.

SOBREDOSIS

Puede producir color azulado de uñas, labios o piel. Convulsiones. Vómitos o dolor de estómago intenso. Dificultad para respirar. Cefalea. Variaciones de la presión arterial.

TRATAMIENTO DE LA SOBREDOSIS

-Vaciado del estómago mediante inducción de la emesis o lavado gástrico.
-Vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales.
-Inducción de la diuresis.
-Administración de carbón adsorbente.

RESTRICCIONES DE USO

Evitar el uso de **Ibuprofeno** durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre. No se recomienda su uso en periodo de lactancia.

CONSERVACIÓN

Admitir en lugar seco, a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 10 comprimidos revestidos de acción sostenida.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535