

CONTEX AMOXICILINA

Comprimidos Revestidos 500 mg

Polvo para suspensión 250 mg/5 mL

Polvo para suspensión 500 mg/5 mL

Antibiótico de amplio espectro de acción bactericida

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....500 mg

Excipientes: Almidón Glicolato de Sodio 19 mg; Propilenglicol 1,87 mg; Alcohol Etilico 0,20 mL; Color Amarillo FDC N°5 lake 0,90 mg; Otros Excipientes c.s.

Cada 5 mL de CONTEX SUSPENSIÓN contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....250 mg

Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de CONTEX 500 SUSPENSIÓN contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....500 mg

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CONTEX contiene **Amoxicilina**, antibiótico bactericida de amplio espectro que tiene acción sobre gérmenes Gram (+) y Gram (-). Ingerido por vía oral ofrece óptima absorción, elevados niveles plasmáticos, puede administrarse con las comidas, cómoda posología. La **Amoxicilina** es un antibiótico bactericida dependiente de su capacidad para alcanzar y unirse a las proteínas que ligan penicilinas en las membranas citoplasmáticas bacterianas.

Inhibe la síntesis de proteínas, inhibe la división celular y el crecimiento produciendo lisis y elogación de las bacterias sensibles.

INDICACIONES

Tratamiento de procesos infecciosos provocados por gérmenes sensibles a la **Amoxicilina**.

Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario (cistitis, uretritis, nefritis, pielonefritis) causadas por *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* y *Streptococcus faecalis*. Gonorrea producida por *Neisseria gonorrhoeae*.

Tratamiento de infecciones de vías respiratorias altas y bajas (sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis, mastoiditis, neumonías, bronconeumonías, pleuresias, etc.) causadas por estreptococos, neumococos, estafilococos no productores de penicilinas y por *Haemophilus influenzae*.

Tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, incluyendo infecciones de quemaduras producidas por estreptococos, estafilococos no productores de penicilinas, *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

Infecciones digestivas y hepatobiliares: colecistitis, enterocolitis, prostatitis, preoperatorio en intervenciones abdominales.

Infecciones ginecológicas: Anexitis, metritis, etc.

Infecciones odontológicas a gérmenes sensibles.

Infecciones graves producidas por gérmenes resistentes a otros antibióticos.

POSOLOGÍA

Adultos: 1 comprimido revestido cada 8 horas.

Niños: puede calcularse a razón de 34 a 100 mg/kg peso/día.

De referencia: 2,5 a 10 mL de suspensión cada 8 horas.

A criterio del médico y según la gravedad de cuadro se puede duplicar la dosis o administrar cada 6 horas.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las Penicilinas. Antecedentes de alergia general (asma, eczema,

fiebre de heno, urticaria). Colitis ulcerosa. Disfunción renal.

REACCIONES ADVERSAS

Cansancio o debilidad no habituales, rash cutáneo, urticaria, prurito, sibilancias. Diarrea acuosa, náuseas, vómitos. Pueden presentarse también calambres, dolores de abdomen.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda tener cuidado en pacientes con antecedentes de anafilaxia frente a las Penicilinas. Se aconseja no utilizar durante la lactancia, ya que puede dar lugar a sensibilización, diarrea y rash cutáneo en el lactante. Administrar con precaución en pacientes sensibles a Cefalosporinas.

Este medicamento contiene como excipiente Almidón Glicolato de Sodio por cada comprimido revestido, los enfermos celíacos deben consultar con su médico antes de utilizarlo. También contiene como excipiente 0,25 g de Alcohol Etilico por cada comprimido revestido, lo que puede ser causa de riesgo en niños. Además contiene como excipiente Color Amarillo FDC N°5 por cada comprimido revestido, puede causar reacciones tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico

INTERACCIONES

El uso simultáneo con Alopurinol puede aumentar la incidencia de rash cutáneo. Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfamidas o Tetraciclinas pueden interferir en los efectos bactericidas de la **Amoxicilina**. La **Amoxicilina** puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos.

El Probenecid disminuye la secreción tubular renal de la **Amoxicilina**

SOBREDOSIS.

Calambres y dolores fuertes en el abdomen o estómago, diarrea sanguinolenta, disfunción plaquetaria, nefritis intersticial, candidiasis oral.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

Reposición de líquidos, electrolitos y proteínas.

Evitar la administración de antidiarreicos antiperistálticos ya que puede prolongar y/o empeorar la diarrea.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes con antecedentes de trastornos hemorrágicos. Enteritis regional o colitis asociada a antibióticos. Monocelulosis infecciosa. Sensibilidad a las Penicilinas. Embarazo y lactancia.

CONSERVACIÓN

Comprimidos - Suspensión: Conservar a temperatura ambiente no mayor 30° C.

Suspensión 500: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admisible entre 15° y 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos.

Caja conteniendo 1 frasco con polvo para preparar 75 mL de suspensión extemporánea + jeringa dosificadora de CONTEX SUSPENSIÓN EXTEMPORÁNEA.

Caja conteniendo 1 frasco con polvo para preparar 90 mL de suspensión extemporánea + jeringa dosificadora de CONTEX SUSPENSIÓN EXTEMPORÁNEA.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada
Bolivia: Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535