

CONTEX MUCOLÍTICO

Amoxicilina - Bromhexina

Comprimidos Revestidos - Suspensión

Antibiótico - Mucolítico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido de CONTEX MUCOLÍTICO contiene:

Amoxicilina (como trihidrato).....	500 mg
Bromhexina HCl.....	8 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada 5 mL de CONTEX MUCOLÍTICO 500 suspensión contiene:

Amoxicilina (como trihidrato).....	500 mg
Bromhexina HCl.....	4 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CONTEX MUCOLÍTICO comprimidos y suspensión contiene **Amoxicilina**, antibiótico de amplio espectro, asociado con **Bromhexina**, que aumenta y fluidifica las secreciones viscosas del tracto respiratorio.

INDICACIONES

CONTEX MUCOLÍTICO está indicado en todos los procesos infecciosos a gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos sensibles a la **Amoxicilina** y en los que hay secreciones viscosas que deben ser removidas: sinusitis, laringitis, traqueitis, bronquitis crónica de los fumadores.

POSOLOGÍA

CONTEX MUCOLÍTICO COMPRIMIDOS:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 8 horas.

CONTEX MUCOLÍTICO 500 SUSPENSIÓN:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL cada 8 horas.

Niños entre 4 y 12 años: 5 mL cada 8 horas.

Niños menores de 3 años: 2,5 mL cada 8 horas.

La dosis ponderal puede calcularse en base a 50 mg/kg/día de **Amoxicilina**

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones alérgicas, cansancio o debilidad no habituales, rash cutáneo, urticaria, prurito o sibilancias, diarrea leve, náuseas o vómitos. Molestias gastrointestinales, por lo general leves.

Reacciones cutáneas graves de frecuencia no conocida: Eritema multiforme; síndrome de Stevens - Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, Pustulosis exantemata generalizada aguda.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda tener cuidado en pacientes con antecedentes de anafilaxia a las penicilinas. No se recomienda su administración durante el primer trimestre de embarazo. Atraviesa la placenta y no se han descrito contraindicaciones en el periodo de lactancia. El uso de penicilinas en lactantes y niños puede dar lugar a sensibilización, diarrea, candidiasis y rash cutáneo. Puede producir inflamación en la boca y glositis.

Si el paciente presenta síntomas o signos de exantema progresivo (en ocasiones asociado a ampollas o lesiones de las mucosas), se debe interrumpir inmediatamente

el tratamiento con **Bromhexina** y consultar a un médico.

El clearance de la **Bromhexina** se reduce en pacientes con deterioro renal o hepático.

CONTRAINDICACIONES

Se deberá evaluar la relación riesgo beneficio en pacientes con antecedentes de alergia general (asma, eczema, urticaria), antecedentes de colitis ulcerosa, mononucleosis infecciosa o disfunción renal. Pacientes con antecedentes de úlcera péptica.

INTERACCIONES

-El uso simultáneo de Alopurinol puede aumentar la incidencia del rash cutáneo.

-El Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfamidas o Tetracilinas pueden interferir en los efectos bactericidas de la **Amoxicilina**.

-La **Amoxicilina** puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos.

-El Probenecid disminuye la secreción tubular renal de la **Amoxicilina**.

-La **Bromhexina** potencia el efecto broncodilatador de los β_2 -adrenérgicos.

Además mejora la penetración de los antibióticos en el árbol bronquial.

SOBREDOSIS

-Broncoespasmo.

-Hematomas no habituales.

-Calambre y dolor fuerte en el abdomen o estómago.

-Diarrea acuosa suave, que puede ser sanguinolenta.

TRATAMIENTO

-Oxígeno.

-Epinefrina parenteral.

-Administrar antihistamínicos y corticosteroides sintéticos para las reacciones de hipersensibilidad.

-Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

En pacientes alérgicos a la penicilina. Embarazo.

CONSERVACIÓN

Suspensión: Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Una vez reconstituido este producto debe ser conservado en heladera a temperatura entre 2°C y 8°C por un periodo no mayor a 10 días.

Comprimidos Revestidos: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Contex Mucolítico comprimidos, cajas x 12.

Contex Mucolítico 500 suspensión, frasco x 75 mL + jeringa dosificadora.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535