

CALCIOFAR 500

Calcio elemental 500 mg

Comprimidos Revestidos

Calcioterapia Oral

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Calcio elemental (como Fosfato Tricálcico).....500 mg
Excipientes.....C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CALCIOFAR 500, contiene **Fosfato Tricálcico** que aporta Calcio y Fósforo al organismo y cuyos metabolitos están íntimamente relacionados, en especial en lo que se refiere al metabolismo óseo-dentario.

Las mujeres embarazadas y lactantes precisan particularmente tomas adicionales de Calcio, pues se ha demostrado que el contenido de este elemento en la alimentación (leche, queso, huevo, frutas, etc.) no es suficiente en esta época.

INDICACIONES

En todos los casos en que estén aumentados los requerimientos del Calcio, embarazo, lactancia, raquitismo, prevención de caries, astenia, inapetencia, descalcificación, osteoporosis. Complemento cálcico alimentario.

POSOLOGÍA

1 a 3 comprimidos revestidos al día, salvo mejor criterio médico.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente pueden aparecer constipación, mareos, sabor metálico, náuseas, sequedad bucal y gastralgias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si se administra junto con digitálicos se deberá tener precaución ya que si existe hipercalcemia pueden aparecer arritmias.

Las necesidades de Calcio son mayores en los ancianos, por lo que puede ser necesario ajustar la dosis de acuerdo con ello.

El uso simultáneo en grandes cantidades de fibra o filatos presentes en salvado, pan y cereales integrales, especialmente en pacientes que están siendo tratados de hipocalcemia puede reducir la absorción de Calcio por formación de complejos inabsorbibles.

INTERACCIONES

La administración concomitante de Fenitoína disminuye la biodisponibilidad del Calcio. El uso simultáneo de Calcio y tetraciclinas orales puede disminuir la absorción de las tetraciclinas debido a la posible formación de complejos no absorbibles.

Los medicamentos que contienen Magnesio pueden incrementar las concentraciones séricas del Calcio. El Calcio antagoniza el efecto de Nitrato de Galio.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al Calcio. Hipercalcemia. Hipercalciuria. Cálculos renales.

SOBREDOSIS

Heces negras alquitranadas, diarrea, calambres y dolor de estómago, temblores, debilidad, sudoración, hipotensión.

TRATAMIENTO

- Inmediata suspensión de la administración.
- Ingestión de líquido en abundancia.
- Dieta baja en Calcio.
- Acidificación de la orina.
- Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio al administrarse a pacientes que presenten deshidratación o desequilibrio electrolítico ya que puede aumentar el riesgo de hipercalcemia, diarrea o mal absorción gastrointestinal crónica por el aumento de la excreción fecal de Calcio.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 comprimidos revestidos.

Mántengase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13