

CECAN 1 g

Cefazolina Estéril 1 g

Inyectable

Antibiótico bactericida de amplio espectro

Vía de Administración: Inyectable IM-IV

FÓRMULA

Cada frasco-ampolla de CECAN 1 g INYECTABLE contiene:
Cefazolina (como sal sódica).....1g.
Cada ampolla de solvente contiene:
Agua destilada.....5mL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CECAN 1 g INYECTABLE es un antibiótico cefalosporínico semisintético de amplio espectro de acción, para administración parenteral, mediante inyección intramuscular o intravenosa. CECAN 1 g INYECTABLE ha demostrado actividad antibiótica bactericida ante los siguientes microorganismos: Streptococos, Gonococos, Neumococos, Stafilococos, Streptococos beta hemolíticos, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Escherichia coli, Proteus mirabilis y Treponema pallidum (in vivo). CECAN 1 g INYECTABLE ha demostrado actividad ante todas las cepas de streptococos, neumococos y stafilococos penicilinoresistentes.

INDICACIONES

CECAN 1 g INYECTABLE, está indicado en todas las infecciones causadas por gérmenes Gram (+) y Gram (-) que requieran un tratamiento antibiótico inyectable, como: Infecciones broncopulmonares-neumopatías agudas y crónicas. Infecciones otorrinolaringológicas y estomatológicas. Infecciones uro-genitales. Infecciones osteo-articulares, y tejidos blandos. Infecciones ginecológicas y obstétricas. Prevención de las infecciones fetales en caso de ruptura prematura de membranas. Infecciones quirúrgicas y viscerales por stafilococos. Blenorragia y sífilis primaria. Pediatría: Se utiliza especialmente en lactantes y prematuros ya que CECAN 1 g INYECTABLE no esta sometido a metabolización hepática.

POSOLOGÍA

CECAN 1 g INYECTABLE debe ser disuelto para su inyección intramuscular o intravenosa en 5 ml de agua destilada para inyección.
Se sugiere inyectar CECAN 1 g INYECTABLE en forma intravenosa lenta o en las grandes masas musculares.

Adultos: dosis usual en infecciones de moderada severidad, es de 0,5 g a 1 a 3 veces al día, en casos más severos pueden necesitar hasta 4 veces al día.

Pueden administrarse hasta 12 g, en el adulto gracias a la baja nefrotoxicidad de la droga.

Niños: La dosis de CECAN 1 g INYECTABLE en infecciones de moderada severidad es de 30 a 50 mg, por kilo de peso por día. Para infecciones de severa intensidad la dosis será de 50 a 100 mg por kilo de peso por día.

CECAN 1 g INYECTABLE puede usarse en perfusión, siendo compatible con los líquidos intravenosos más comúnmente usados.

REACCIONES ADVERSAS

En casos de hipersensibilidad pueden presentarse urticaria, rash eritematosos y maculopapulares, reacciones anafilácticas, fiebre y eosinofilia.

Vaginitis y nefrotoxicidad. Reacciones hematológicas como Neutropenia, leucopenia, trombocitopenia y pruebas de Coombs directa o indirecta positivas.

Reacciones Gastrointestinales: Náuseas, anorexia, vómitos, diarrea y aftas bucales (candidiasis) en algunos casos. Durante el tratamiento o después pueden aparecer síntomas de colitis pseudomembranosa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

CECAN 1 g INYECTABLE debe administrarse con precaución cuando se asocia a otros antibióticos con potencial nefrotóxico como gentamicina, kanamicina, polimixina B y colistina.

CONTRAINDICACIONES

CECAN 1 g INYECTABLE esta contraindicado en aquellas personas que han demostrado hipersensibilidad a esta u otras cefalosporinas. Los antibióticos incluyendo **Cefazolina** deben ser administrados con cautela en pacientes que han demostrado algún tipo de alergia, especialmente medicamentosas.

La **Cefazolina** esta contraindicado en insuficiencia renal.

INTERACCIONES

El Probenecid produce una disminución en la secreción tubular de la **Cefazolina**.

Puede inhibirse la acción de la **Cefazolina** por la administración simultánea de agentes bacteriostáticos (tetraciclina, cloranfenicol, sulfamidas).

Los antibióticos aminoglicósidos, la furosemida y el ácido etacrínico aumentan la nefrotoxicidad de la **Cefazolina**.

SOBREDOSIS

Hemorragia o hematomas no habituales. Calambres y dolor grave en el abdomen o el estómago; diarrea acuosa, y grave que también puede ser sanguinolenta. Fiebre.

TRATAMIENTO

El tratamiento de sobredosis debe ser sintomático y de apoyo.

OBSERVACIÓN

Cecan 1 g inyectable se elimina por la vía renal bajo forma activa no metabolizada.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura no mayor a 30° C.

RESTRICCIONES DE USO

En pacientes alérgicos a penicilinas, derivados de penicilina, penicilamina o cefalosporinas. Embarazo. Lactancia, antecedentes de patología gastrointestinal como colitis; disfunción hepática o disfunción renal.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco-ampolla 1g. con polvo para solución inyectable + 1 ampolla de solvente x 5 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418"



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de INDUFAR CISA

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaaavedra y
Bella Vista - Frdo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13