CECAN 1 g CEFALEXINA 1 g

Comprimidos Revestidos Antibiótico cefalosporínico de amplio espectro

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:		
Cefalexina (como monohidrato)	1	
Excinientes	0	

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CECAN 1 g (Cefalexina), es un antibiótico cefalosporínico bactericida con eficaz acción contra gérmenes Gram(+) y Gram(-), de excelente absorción intestinal, de eliminación urinaria prevalente y penicilinasa resistente, con buena penetración en los tejidos y líquidos orgánicos.

INDICACIONES

Infecciones estafilocóccicas y estreptocóccicas de piel: Impétigo, forúnculos, ántrax, hidroadenitis, panadizos.

Infecciones de las vías urinarias: Cistitis, uretritis, pielonefritis.

Infecciones de vías respiratorias altas y bajas: Amigdalitis, Faringitis, Traqueobronquitis, Bronconeumonías, Neumonías, Otitis media y externa.

Enfermedades virósicas eruptivas: Sarampión, Rubéola, Varicela, Herpes zoster, Parotiditis, Estomatitis Inflamatorias y Exudativas.

En gineco-obstetricia: Aborto séptico, Anexitis, Metritis.

POSOLOGÍA

Como orientación se sugiere 1 a 2 gramos por día, administrados en dosis divididas cada 12 horas. En casos severos se pueden administrar hasta 4 a 6 gramos al día.

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones alérgicas, específicamente anafilaxia. Eritema multiforme o síndrome de Stevens - Johnson (ampollas, descamación o exfoliación de la piel y membranas mucosas; puede implicar los ojos u otros sistemas orgánicos. Hipersensibilidad (fiebre, rash, prurito, enrojecimiento o hinchazón cutáneos).

PRECAUCIONES

Puede presentarse a veces una reacción de hipersensibilidad con la penicilina. Usar con cautela en pacientes con insuficiencias renales severas. "Este medicamento contiene Lactosa". si el médico le ha indicado que padece de intolerancia a ciertos azúcares, consulte antes de tomar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES

Esta contraindicado en pacientes con alergia conocida a los antibióticos del grupo de las cefalosporinas. Alergias a las penicilinas. Primer trimestre del embarazo. Lactancia

INTERACCIONES

Cuando se administra con aminoglucósidos debe controlarse la función renal.

SOBREDOSIS

Hemorragia o hematomas no habituales. Calambres y dolor grave en el abdomen o el estomago, diarrea acuosa y grave que también puede ser sanguinolenta, fiebre.

TRATAMIENTO

El tratamiento de sobredosis debe ser sintomático y de apoyo.

RESTRICCIONES DE USO

Debe administrarse con cautela a los pacientes con insuficiencias renales severas.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura no mayor a 30º C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.

Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm. Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535 División de INDUFAR CISA Planta Industrial y distribución; Calle Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista - Fndo. de la Mora Zona Norte - Paraguay E-mail: indufar@indufar.com.py P. web: www.indufar.com.py Teléfonos: 682 510 al 13