

CONTEX NOVO

Amoxicilina 1g

Comprimidos Revestidos

Polvo para suspensión extemporánea

Antibiótico de amplio espectro de acción bactericida

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....1 g
Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de suspensión extemporánea contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....1g
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

CONTEX NOVO contiene **Amoxicilina**, antibiótico bactericida de amplio espectro que tiene acción sobre gérmenes Gram (+) y Gram (-). Ingerido por vía oral ofrece óptima absorción, elevados niveles plasmáticos, puede administrarse con las comidas, cómoda posología.

INDICACIONES

Tratamiento de procesos infecciosos provocados por gérmenes sensibles a la **Amoxicilina**.

Tratamiento de infecciones del tracto genitourinario (cistitis, uretritis, nefritis, pielonefritis) causadas por *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* y *Streptococcus faecalis*. Gonorrea producida por *Neisseria gonorrhoeae*.

Tratamiento de infecciones de vías respiratorias altas y bajas (sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis, mastoiditis, neumonías, bronconeumonías, pleuresías, etc.) causadas por estreptococos, neumococos, estafilococos no productores de penicilinas y por *Haemophilus influenzae*.

Tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, incluyendo infecciones de quemaduras producidas por estreptococos, estafilococos no productores de penicilinas, *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

Infecciones digestivas y hepatobiliares: colecistitis, enterocolitis, prostatitis, pre-operatorio en intervenciones abdominales.

Infecciones ginecológicas: Anexitis, metritis, etc.

Infecciones odontológicas a gérmenes sensibles.

Infecciones graves producidas por gérmenes resistentes a otros antibióticos.

POSOLOGÍA

Adultos: 1 comprimido revestido de CONTEX NOVO cada 12 horas.

Niños menores de 10 años: 2,5 mL de CONTEX NOVO Suspensión Extemporánea cada 12 horas.

Niños con más de 20 Kg de peso 5 mL de CONTEX NOVO Suspensión Extemporánea cada 12 horas.

La dosis diaria puede calcularse a razón de 34 a 100 mg/kg peso/día.

En los casos más graves es posible duplicar la dosis o administrar cada 6 horas, según indicación médica.

REACCIONES ADVERSAS

Cansancio o debilidad no habituales, rash cutáneo, urticaria, prurito, sibilancias. Diarrea acuosa, náuseas, vómitos. Pueden presentarse también calambres,

dolores de abdomen estómago, sensibilidad al dolor por presión o contacto en el abdomen.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se aconseja no utilizar durante la lactancia, ya que puede dar lugar a sensibilización, diarrea y rash cutáneo en el lactante. Administrar con precaución en pacientes sensibles a cefalosporinas.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las penicilinas. Antecedentes de alergia general (asma, eccema, fiebre de heno, urticaria). Colitis ulcerosa. Disfunción renal.

INTERACCIONES

El uso simultáneo con Alopurinol puede aumentar la incidencia de rash cutáneo. Cloranfenicol, Entromicina, Sulfamidas o Tetraciclinas pueden interferir en los efectos bactericidas.

SOBREDOSIS

- Calambres y dolores fuertes en el abdomen o estómago.
- Diarrea sanguinolenta.
- Difusión plaquetaria.
- Nefritis intersticial.
- Candidiasis oral.

TRATAMIENTO

- El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.
- Reposición de líquidos, electrolitos y proteínas.
- Evitar la administración de antidiarreicos antiperistálticos ya que puede prolongar y/o empeorar la diarrea.

RESTRICCIONES DE USO

Se deberá evaluar la relación riesgo-beneficio en pacientes con antecedentes de colitis ulcerosa, mononucleosis infecciosa o disfunción renal.

CONSERVACIÓN

Comprimidos: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

Suspensión Extemporánea: Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C una vez reconstituido este producto debe ser conservado en heladera a temperatura entre 2° C y 8° C por un periodo no mayor a 10 días.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 16 comprimidos revestidos.

Caja conteniendo frasco con polvo para preparar 100 mL de suspensión extemporánea.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



LABORATORIO S
INDUFAR
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13