

Clinomin Forte

Estradiol - Progesterona - Lidocaína
Suspensión Inyectable

Tratamiento sintomático de la amenorrea

Vía de administración.: Inyectable IM

FÓRMULA

Cada frasco-ampolla de 6 mL contiene:

Estradiol (como benzoato)	12 mg
Progesterona	60 mg
Lidocaína (como clorhidrato)	40 mg
Excipientes	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Asociación hormonal de acción medianamente sostenida.

INDICACIONES

Atraso en la aparición de la menstruación. Amenorrea. Hipomenorrea. Irregularidades del ciclo menstrual.

POSOLOGÍA

1 a 6 mL por vía intramuscular.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Atraso en la aparición de la menstruación (inducción retardada): 2 mL IM El advenimiento de una metrorragia dentro de los 10 días de la administración significa que el atraso de la menstruación no es atribuible a un embarazo.

Amenorrea: 2 a 6 mL IM, según la duración de la amenorrea. La metrorragia se presenta dentro de los 8 a 10 días posteriores a la inyección, excepto que la amenorrea esté causada por embarazo, disfunción del eje hipotálamo-hipofisogonadal, insuficiencia ovárica, o que se trate de una amenorrea uterina. Si se considera necesario, repetir la misma dosis todos los meses en la misma fecha. En caso de ausencia de respuesta, la dosis puede ser repetida cada 10 días, según criterio médico.

Hipomenorrea: 1 mL IM en el día 20 del ciclo menstrual. Repetir la misma dosis, con igual esquema en los meses subsiguientes, si se considera necesario.

Irregularidades del ciclo menstrual (inducción precoz): en mujeres con ciclos menstruales irregulares, si se desea obtener la metrorragia en fecha precisa; en ausencia de embarazo, pueden ser administrados 2 mL, de CLINOMIN FORTE, en el día 22 del ciclo.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de herpes gravídico, tumores hormona dependientes sospechados o comprobados, trastornos tromboembólicos en evolución. Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación. Carcinoma de mama. Hemorragias vaginales sin diagnóstico. Embarazo. Lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Son de incidencia menos frecuente o rara: cefaleas, sensación de falta de aire, náuseas, mayor tensión, anorexia, alteraciones del ciclo menstrual: hemorragia prolongada o amenorrea, aumento o disminución de peso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si como respuesta a la administración aparece una hemorragia profusa se deberá descartar la existencia de otra patología concomitante. Administrar con precaución a pacientes con antecedente de asma, insuficiencia cardíaca o epilepsia. Agitar el frasco antes de extraer el contenido. Se aconseja vigilar el estado de las mamas y órganos pelvianos, así como pacientes con antecedentes depresivos. Pueden modificarse resultados de determinaciones de laboratorio relativas a la función hepática, test de coagulabilidad.

INTERACCIONES

El uso simultáneo de glucocorticoides puede alterar el metabolismo de éstos al aumentar la vida media de eliminación del **Estradiol** y con ello sus efectos terapéuticos y tóxicos. Los Estrógenos pueden producir amenorrea, e interferir así en los efectos de la Bromocriptina. Aumenta el riesgo de hepatotoxicidad al administrarse con medicamentos hepatotóxicos. Se acelera la maduración de la epísis en uso simultáneo con somatotropina. Puede interferir el efecto terapéutico del Tamoxifeno.

SOBREDOSIS

Cefaleas. Pérdida repentina de la coordinación. Hemorragia prolongada o amenorrea. Ictericia colestática. Embolismo pulmonar.

TRATAMIENTO

Debe ser sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio en trastornos tromboembólicos, de la función hepática o renal.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco-ampolla x 6 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta bajo receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaaedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535