

# Cimaxif

## Cefixima 400 mg-100 mg/5ml

### Comprimidos Revestidos - Suspensión Oral

### Antibiótico bactericida de amplio espectro cefalosporina oral de tercera generación

#### Vía de Administración: Oral

#### FÓRMULAS

Cada comprimido revestido contiene:

Cefixima (como trihidrato).....400 mg

Excipientes.....c.s.

Cada 5 ml. de suspensión oral contiene:

Cefixima (como trihidrato).....100 mg

Excipientes.....c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA

CIMAFIX es un antibiótico cefalosporínico de tercera generación, para administración oral y de una sola toma diaria.

CIMAFIX tiene una acción similar a la que presentan las cefalosporinas de tercera generación que son administradas por vía parenteral y con actividad mayor que otros similares orales, frente a microorganismos Gram-negativos.

CIMAFIX además posee, efectividad más potente que otras cefalosporinas orales convencionales, en procesos infecciosos del tracto respiratorio, urinario y biliar.

CIMAFIX ha demostrado una actividad antibiótica bactericida sobre gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos, productores o no de B-lactamasa, como por ejemplo, Haemophilus influenzae (cepas B-lactamasa positivas y negativas), Branhamella catarrhalis, Moraxella, (la mayoría de los cuales son B-lactamasa positivas), Streptococcus Pyogenes y Pneumoniae, Escherichia coli, Proteus indol positivo y negativo, Providencia y N. Gonorrhoeae.

#### INDICACIONES

CIMAFIX, está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones producidas por microorganismos susceptibles: infecciones otorrinolaringológicas, infecciones de las vías respiratorias altas y bajas, por ejemplo: otitis media, faringitis, amigdalitis, bronquitis agudas, exacerbadión de bronquitis crónicas y neumonías. Infecciones de vías urinarias no complicadas.

#### CONTRAINDICACIONES

CIMAFIX está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al grupo de antibióticos cefalosporínicos.

#### POSOLOGÍA

La dosis usual en adultos es de 1 comprimido de 400 mg, en una sola toma diaria.

La dosis usual recomendada en niños es de 8 mg/Kg/día en una sola toma diaria. En la practica: 4 mL, de la suspensión, por cada 10 Kg, de peso.

En niños mayores de 12 años o más de 50 Kg, se recomienda usar

igual dosis que en adultos.

No es necesario aumentar la dosis en relación a la severidad del cuadro.

#### REACCIONES ADVERSAS

En los valores de laboratorio no se produjeron anormalidades.

Tampoco se presentaron acciones colaterales ni efectos secundarios.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Antes de iniciar una terapia con CIMAFIX, se aconseja realizar previamente test de hipersensibilidad a las Cefalosporinas y Penicilinas. Administrar con cautela en pacientes penicilinosensibles.

Deben realizarse estudios de la función renal cuando estén indicados en pacientes renales crónicos.

#### INTERACCIONES

Administrado simultáneamente con Probenecid disminuye la secreción tubular renal de la **Cefixima** dando como resultado el aumento y prolongación de la concentración sérica. Al administrar con inhibidores de la agregación plaquetaria puede aumentar el riesgo de hemorragia debido a la inhibición de la función plaquetaria. El uso simultáneo de alcohol con **Cefixima** puede dar lugar a la acumulación de acetaldehído en la sangre.

#### SOBREDOSIS

Pueden presentarse síntomas como: Calambres, dolor y distensión abdominal o de estómago, diarrea acuosa, náuseas, vómitos, fiebre.

#### TRATAMIENTO

Interrupción de la medicación, reposición de fluidos, tratamiento sintomático y de apoyo.

#### RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y lactancia.

#### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

#### PRESENTACIONES

Caja conteniendo 10 comprimidos revestidos.

Frasco conteniendo polvo para preparar 100 ml de suspensión oral.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Simple Archivada

**"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en las calles Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535