

# CLONIDOX

## Clopidogrel 75 mg

### Antiagregante Plaquetario

#### Comprimidos Revestidos

Vía Administración: Oral

#### FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Clopidogrel (como bisulfato).....75 mg

Excipientes.....c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA

El **Clopidogrel** es un inhibidor selectivo de la unión de la Adenosina Difosfato (ADP) a su receptor plaquetario. Esta inhibición es de carácter irreversible por lo que la restauración de la función plaquetaria normal depende de la generación de nuevas plaquetas (aproximadamente 7 días). Los niveles plasmáticos son más elevados en pacientes mayores de 65 años, sin que esto se refleje en un incremento de la inhibición plaquetaria ni el tiempo de sangría.

#### INDICACIONES

Profilaxis de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otros eventos vasculares isquémicos, en pacientes con antecedentes de aterosclerosis sintomática definida por infarto cerebral isquémico (desde los 7 días hasta un máximo de 6 meses), infarto de miocardio (desde los pocos días hasta un máximo de 35 días) o arteriopatía periférica establecida o necesidad de bypass o angioplastia.

#### POSOLOGÍA

La dosificación para adultos es de 75 mg diarios en dosis única, sin ajustes para ancianos o pacientes con insuficiencia renal, con o sin alimentos.

#### REACCIONES ADVERSAS

En general es bien tolerado, presentándose en raras ocasiones diarrea, erupción cutánea, úlcera gástrica, discrasias sanguíneas así como hemorragias.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con precaución en pacientes con riesgo de hemorragia. En caso de cirugía programada, debería suspenderse CLONIDOX con 7 días de antelación.

Debe advertirse a los pacientes de la posibilidad de sangrados más prolongados cuando están en tratamiento con CLONIDOX y que deben informar a su médico de cualquier hemorragia no habitual. En pacientes con infarto de miocardio el tratamiento con CLONIDOX no debe iniciarse durante los primeros días tras el infarto de miocardio.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al **Clopidogrel**. Insuficiencia hepática severa. Hemorragia patológica activa (úlceras pépticas o hemorragia intracraneal). Lactancia. Embarazo.

#### INTERACCIONES

El **Ácido Acetilsalicílico** y otros **AINés**: administrar con precaución, debido al riesgo de efectos sinérgicos sobre la agregación plaquetaria.

**Heparina**: administrar con precaución, debido al riesgo de efectos sinérgicos sobre la coagulación.

**Activador tisular del plasminógeno recombinante**: administrar con precaución, debido al riesgo de efectos sinérgicos sobre la coagulación.

**Warfarina**: administrar con precaución, debido al riesgo de efectos sinérgicos sobre la coagulación.

**Atenolol, Nifedipina, Fenobarbital, Cimetidina, estrógenos**: pueden administrarse en forma conjunta, no se observaron interacciones farmacodinámicas entre estos fármacos y **Clopidogrel**.

**Antiácidos**: no modifican la absorción de **Clopidogrel**.

**Digoxina, Teofilina**: se ha comprobado que el **Clopidogrel** no altera la farmacocinética de estas drogas.

**Fenitoína, Tolbutamida y otras drogas metabolizadas por CYP2C9**: posible aumento de los niveles plasmáticos de éstas, debido a que **Clopidogrel** inhibe la enzima CYP2C9 del citocromo P450.

**Diuréticos, beta-bloqueantes, IECA, bloqueantes cálcicos, hipocolesterolémicos, vasodilatadores coronarios, antidiabéticos, antiepilépticos**: no se han registrado interacciones con significación clínica.

#### SOBREDOSIS

Aumento en el tiempo de sangría, diarrea, hemorragia gastrointestinal.

#### TRATAMIENTO

El tratamiento deberá ser sintomático y de mantenimiento.

#### RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar en pacientes con enfermedad hepática grave, debido al riesgo de diátesis hemorrágica.

#### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

#### PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta bajo receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13

 **MEDICAMENTOS  
CARDIOLÓGICOS**  
División de **INDUFAR CISA**  
Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535