DISCAL 70

Alendronato 70 mg
(Ácido Alendrónico 70 mg)

Regulador del Calcio óseo

Comprimidos

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA
Cada comprimido contiene:
Ácido Alendrónico (como Alendronato monosódico trihidrato)....70 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
El **Alendronato** inhibe la pérdida de hueso por excesiva resorción mediada por los osteoclastos. Produce un balance óseo positivo. Aumenta la densidad mineral ósea de la columna vertebral y fémur proximal, así como la masa esquelética total. Carece de efectos adversos y los riesgos que presentan otras opciones terapéuticas. Antiosteoporótico.

INDICACIONES
DISCAL 70 está indicado para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y procesos osteoporóticos seniles. Osteoporosis inducida por corticoides. Enfermedad de Paget.

POSOLOGÍA
La dosis recomendada es de 1 comprimido (70 mg) por semana tomado por la mañana luego del ayuno nocturno, por lo menos media hora antes del primer alimento, bebida o medicación del día, acompañado de un vaso completo de agua (no agua mineral o soda), permaneciendo luego de la administración en posición de pie o sentado por lo menos 30 minutos después de la toma. De omitirse la dosis matinal, no reponerla más tarde y proseguir el tratamiento al día siguiente con las mismas precauciones.

REACCIONES ADVERSAS
Posee muy buena tolerancia digestiva y sistémica. Utilizando cantidades más elevadas, existe la posibilidad de que se presenten trastornos gastrointestinales (dolor abdominal, molestias esofágicas, dispepsias, náuseas). Raras veces aparecen eritemas o rash cutáneo. Algunos pacientes presentan a veces una reducción transitoria y asintomática de la calcemia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave, o con lesiones activas del tubo gastrointestinal. Anormalidades esofágicas (estenosis o acalasia).
No masticar el comprimido por el peligro de úlcera esofágica. Las alteraciones del metabolismo mineral, la hipovitaminosis D y la hipocalcemia, deben ser corregidas antes de iniciar el tratamiento. Los suplementos de Calcio deben ser tomados media hora antes de la administración de Discal 70.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a la droga, úlcera gastrointestinal activa, hipocalcemia, embarazo, lactancia.

INTERACCIONES
El Sucralfato, el Calcio y las sales biliares pueden interferir en la absorción del **Alendronato**.

SOBREDOSIS
Trastornos o pirosis gástrica, esofagitis, distensión abdominal, náuseas, flatulencia.

TRATAMIENTO
Lavado gástrico o administración de carbón activado. Administrar leche o antiácidos para secuestrar el **Alendronato** y evitar su absorción. No inducir al vómito. El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO
Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio al administrarse a embarazadas y durante la lactancia.

CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25ºC. Variación admitida entre 15º y 30ºC.

PRESENTACIÓN
Cajas conteniendo 4 comprimidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

LABORATORIOS INDUFAR
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13