

# Dermafar *Crema*

**Vitamina A - Vitamina D3 - Ácido Bórico  
Óxido de Zinc.**

**Cicatrizante y regeneradora de los tejidos  
tratamiento de la dermatitis del pañal,  
quemaduras, irritaciones, picazón, sarpullido**

**Vía de administración: Tópica**

## FÓRMULA

Cada 100 gramos de crema contiene:

Vitamina A.....	600.000 U.I.
Vitamina D <sub>3</sub> .....	62.800 U.I.
Ácido Bórico.....	2 g
Óxido de Zinc.....	15 g
Excipientes.....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

**DERMAFAR CREMA** está destinada a proteger la delicada piel del bebé contra las irritaciones, dermatitis amoniacal del pañal y la higiene diaria de los niños. Posee además una acción regeneradora de los tejidos, ayudando a una perfecta cicatrización.

## INDICACIONES

Tratamiento de la dermatitis amoniacal del pañal, sarpullido. Tratamiento de cicatrización en las grietas del pezón de las madres, quemaduras de primer grado, úlceras de decúbito, escaras, eccemas.

## POSOLOGÍA

Niños y lactantes:

Después del cambio de la ropa, limpiar cuidadosamente la zona afectada, aplicar una pequeña porción de la crema masajeando cuidadosamente 2 a 3 veces al día, hasta la total remisión de la sintomatología. De ser necesario cubrir con gasa esterilizada.

Adultos:

Se procede de la misma manera, siempre limpiando la zona afectada y aplicando la crema de 2 a 3 veces al día.

## REACCIONES ADVERSAS

Suspender la administración del medicamento en caso de presentarse rash cutáneo ardor o eritema en la zona de aplicación.

No debe ser aplicado en zonas cercanas a los ojos o mucosas.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Pueden presentarse en la zona de aplicación enrojecimiento, prurito, ardor, escozor, rash cutáneo o urticaria en la zona de aplicación.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación.

## INTERACCIONES

La presente formulación no presenta interacciones significativas con otros fármacos ya que la absorción de sus principios activos a través de esta vía (tópica) es leve.

## SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental: puede producir vómitos, náuseas, cólicos.

En caso de contacto con los ojos: puede producir una irritación menor.

## TRATAMIENTO

En caso de ingestión accidental, inducir el vómito, beber agua para diluir el producto.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua tibia, durante 15 a 20 minutos, hasta que no quede evidencia del producto en los ojos.

Consulte a su médico si la irritación persiste.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Valoración admitida entre 15° y 30° C.

## PRESENTACIÓN

Pomos conteniendo 35 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta libre en farmacias

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13

**LABORATORIOS  
INDUFAR**  
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535