

Emetan AF

Domperidona - Dimetilpolisiloxano



Antiemético - Antidispéptico - Antiflatulento

Suspensión Gotas Orales

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada 1 mL de **EMETAN AF** gotas en forma de suspensión contiene:

Domperidona.....5 mg
Dimetilpolisiloxano.....100 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

EMETAN AF ejerce una marcada acción antiemética, antidiapéptica y antiflatulenta. En su fórmula van asociados **Domperidona**, un eficaz regulador de la motilidad esofago-gastroduodenal, con **Dimetilpolisiloxano**, un conocido antiflatulento de comprobada eficacia espasmolítica.

EMETAN AF inhibe las náuseas y vómitos de cualquier etiología; actúa deprimiendo la zona quimiorreceptora "gatillo" del bulbo, sin excluirse una acción sobre el centro del vómito mismo.

EMETAN AF normaliza la motilidad de la porción esofagogastro-duodenal del tubo digestivo, trastornada en los cuadros dispépticos. Disminuye además, la tensión superficial de las burbujas que se hayan formado en el estómago e intestino; dichas burbujas se reúnen, se agrandan y se rompen dando lugar a gas libre (acción antiflatulenta).

INDICACIONES

Vómitos y náuseas de cualquier etiología. Dispepsia. Flatulencia. Meteorismo gastrointestinal. Plenitud post-prandial. Aerofagia. Reflujo gastroesofágico. Pirosis retroesternal. Preparación para estudios radiológicos abdominales.

POSOLOGÍA

Adultos: 30 a 60 gotas, 3 a 4 veces al día; 15 a 30 minutos antes de las principales comidas.

Niños: 25 gotas, 3 veces al día, 15 a 30 minutos antes de las principales comidas.

Lactantes: 10 gotas, 3 veces al día, antes de las comidas.
*1 mL = 25 gotas = 6,2 mg. 1 gota = 0,25 mg.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse cólicos, hiperprolactinemia que puede provocar galactorrea y ginecomastia. Erupciones y urticaria.

PRECAUCIONES

Evitar el uso simultáneo de anticolinérgicos porque pueden antagonizar los efectos de **EMETAN AF**.

La administración durante el embarazo, se efectuará bajo

prescripción médica, debiendo ser usado con precaución.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación. Embarazo. Lactancia. Hemorragia gastrointestinal.

INTERACCIONES

El Bicarbonato de Sodio, la Cimetidina y los antiácidos interfieren en la absorción de la **Domperidona**. Los anticolinérgicos antagonizan los efectos de la **Domperidona**.

SOBREDOSIS

Somnolencia.
Desorientación.
Reacciones extrapiramidales.

TRATAMIENTO

Lavado gástrico. Tratamiento sintomático y de sostén. Pueden administrarse antihistamínicos y anticolinérgicos para controlar los efectos extrapiramidales.

RESTRICCIONES DE USO

Sensibilidad a las drogas presentes en la formulación. Pacientes con cardiopatías en general. Embarazo. Lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente a 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero x 15 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13