

GARTEM 600

Diosmina 600 mg

Antivaricoso - Antihemorroidal

Comprimidos revestidos

Via de Administración: Oral



FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Diosmina600 mg

Excipientes.....c.s.

PROPIEDADES

La **Diosmina** es un bioflavonoide utilizado de manera similar a la Rutina en el tratamiento de los trastornos venosos.

Disminuye la recaptura de la Noradrenalina a nivel de la célula muscular lisa y por lo tanto a nivel vascular hay disponibilidad de una cantidad mayor del mediador (la Noradrenalina) que puede actuar sobre los receptores venosos. Mejora el débito venoso y disminuye la distensión y estasis venosa. Inhibe la formación de radicales libres de oxígeno. Proteje la pared venosa contra los mediadores bioquímicos implicados en la reacción inflamatoria y ejerce un efecto inhibitorio sobre la síntesis de las prostaglandinas y el tromboxano.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

La **Diosmina** actúa como venotónico y vasculoprotector produciendo una vasoconstricción con aumento de la resistencia de los vasos y una disminución de su permeabilidad.

INDICACIONES

Síndrome prevaricoso (piernas pesadas y dolorosas, edemas). Afecciones de la circulación venosa como: várices incipientes, úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis. Síndromes hemorroidales. Calambres. Estados hemorrágicos ligados a fragilidad capilar: epistaxis, accidentes de la hipertensión, nefritis hematórica, hemorragias ginecológicas. Edemas de origen linfático o venoso. Retinopatía diabética.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se han reportado cefalea, vómitos, náuseas, diarrea y molestias gastrointestinales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Por no existir datos sobre su pasaje a la leche materna, se desaconseja su utilización en mujeres en el período de lactancia. Carece de acción carcinogénica, mutagénica y teratogénica a corto, mediano y largo plazo.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a la **Diosmina**.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Al administrar simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos disminuye la absorción de **Diosmina**.

POSOLÓGIA

Insuficiencia venosa: 1 comprimido por día, a la mañana antes del desayuno.

Crisis hemorroidal: 2 a 3 comprimidos por día con las comidas.

SOBREDOSIS

No existen reportes de sobredosis con **Diosmina**.

TRATAMIENTO

En caso que se sospeche sobredosis por ingestión accidental, realizar tratamiento sintomático y monitoreado de signos vitales.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes con insuficiencia hepática.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15ª y 30ª C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13