

Gartem Hemorroidal

Óxido de Zinc - Extracto fluido de hamamelis

Aceite de hígado de bacalao

Antihemorroidal

Crema

Vía de Administración: Tópica Rectal

FÓRMULA

Cada 100 gramos contiene:

Óxido de Zinc.....	4g
Extracto de Hamamelis.....	5g
Aceite de Hígado de Bacalao.....	4g
Excipientes.....	C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Gartem Hemorroidal es una asociación de sustancias que actúan promoviendo el efectivo tratamiento de las hemorroides. El **Óxido de Zinc** posee una actividad secante, astringente y antiséptica. El **Extracto de Hamamelis** es antipruriginoso, antiinflamatorio y sedativo. El **Aceite de Hígado de Bacalao** le confiere propiedades emolientes y cicatrizantes.

INDICACIONES

Hemorroides sangrantes, internas y externas, fisuras anales, abrasiones y ulceraciones recto-anales, tratamiento coadyuvante de la proctitis y papilitis, manifestaciones relacionadas con la región anal y perianal. Prurito anal.

POSOLOGÍA

Antes de la aplicación debe higienizarse la zona rectal con agua tibia.

Hemorroides externa y prurito anal: aplicar una fina capa de la crema directamente sobre la zona perianal varias veces al día.

Hemorroides interna: utilizar la cánula enroscando a la extremidad del pomo. Introducir la cánula y presionar el pomo para retirar la crema, 2 a 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Debido a sus componentes naturales que son relativamente ino cuos no se han reportado contraindicaciones en su uso tópico, cuidar de no ingerir por vía oral debido a que el contenido de taninos produce molestias digestivas.

REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel

(como dermatitis de contacto, eczemas) o irritación de los ojos y membranas mucosas. Ante la ingestión accidental puede causar vómito, náuseas, sequedad de la boca.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si bien la absorción de los constituyentes es mínima o escasa, se recomienda particular atención en pacientes que cursen con arritmias cardíacas o que ingieran drogas antiarrítmicas y portadores de insuficiencia cardíaca descompensada.

INTERACCIONES

No posee.

SOBREDOSIS

Ante la ingestión de **Gartem Hemorroidal** puede causar vómito, náuseas y sequedad en la boca.

TRATAMIENTO

Por ingestión inducir a la emesis o lavado de estómago.

RESTRICCIONES DE USO

Uso exclusivamente para aplicación anal.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15° C a 30° C).

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo pomo x 20 g. con cánula aplicador.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13