

HEXACOL

Crema

**Antibiótico - Antiinflamatorio
Antimicótico de amplio espectro**

Vía de Administración: Tópica

FÓRMULA

Cada gramo contiene:

Gentamicina (como sulfato).....	1 mg
Betametasona (como 17-Valerato).....	1 mg
Miconazol nitrato.....	20 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

HEXACOL es una efectiva asociación a ser utilizada en afecciones dérmicas en las que hay componentes alérgicos, bacterianos, micóticos, o una combinación de los mismos.

HEXACOL crema alivia rápidamente el prurito, ardor o dolor que se presenta en los citados cuadros. Evita además la urgencia del diagnóstico etiológico.

INDICACIONES

Dermatomicosis. Eczema. Impétigo. Forunculosis. Foliculitis. Intertrigo bacteriano-micótico. Reacciones alérgicas de la piel. Prurito. Micosis superficiales.

POSOLOGÍA

Extender una delgada capa de HEXACOL crema sobre las zonas afectadas, dos a tres veces al día, frotando suavemente para facilitar la penetración en la piel.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en caso de lesiones cutáneas tuberculosas, lesiones herpéticas, varicela y reacciones locales de la vacunación, alergia conocida a cualquiera de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS

Enrojecimiento, prurito, ardor, escozor, rash cutáneo o urticaria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse en zonas extensas, en grandes cantidades ni durante períodos prolongados, en pacientes embarazadas o que proyecten quedarse embarazadas. No aplicarse en las mamas antes de amamantar. Evitar su aplicación a pacientes con heridas profundas, quemaduras graves y zonas en carne viva.

INTERACCIONES

No se han registrado interacciones por vía tópica de la Gentamicina **Betametasona** y **Miconazol**.

SOBREDOSIS

Hinchazón, Enrojecimiento, Escozor.

TRATAMIENTO

Puesto que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

RESTRICCIONES DE USO

No se recomienda su uso en embarazadas o en periodo de lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Pomo conteniendo 20 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gal. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13