

# INAFLEX

## Ketoprofen + Paracetamol

### Comprimidos Gastroprotegidos Suspensión Extemporánea

#### Antiinflamatorio - Analgésico - Antirreumático

Vía de Administración: Oral

#### FÓRMULA

Cada comprimido gastroprotegido contiene:

Ketoprofen.....100 mg

Paracetamol.....400 mg

Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Ketoprofen.....20 mg

Paracetamol.....120 mg

Excipientes.....c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA

INAFLEX es la asociación de un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), el **Ketoprofen** y un analgésico y antifébril que se caracteriza por poseer escasa acción irritante sobre la mucosa gástrica.

Esta asociación permite que INAFLEX posea una actividad antiinflamatoria, rápida acción analgésica, excelente tolerancia, rápido descenso de la fiebre, con amplio margen de seguridad y sin causar alteraciones renales, hepáticas ni sanguíneas.

#### INDICACIONES

Procesos inflamatorios con sus signos patognomónicos: tumor, rubor, dolor y calor. Faringitis, laringitis, reumatismo articular agudo, celulitis, miositis, cistitis, anexitis, uretritis, fracturas, contusiones, mialgias.

Pre y post-operatorio, extracciones dentarias.

#### POSOLOGÍA

**Adultos:** 1 comprimido cada 8 a 12 horas. La dosis máxima para adultos es de 4 g de Paracetamol por día.

**Niños:** 5 mL cada 6 a 8 horas.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al **Ketoprofen** y **Paracetamol**. Úlcera gastro-duodenal. Coagulopatías. Hepatopatías.

#### REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse irritación gastrointestinal, diarreas, náuseas, edema, nerviosismo, mareos, somnolencia, constipación.

Rash cutáneo, escalofríos, urticaria, cansancio o debilidad no habituales, confusión. Ocasionalmente trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia, neutropenia y agranulocitosis, vómitos, diarrea, irritación gastrointestinal, cefaleas, nerviosismo, que desaparecen al discontinuar el tratamiento.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe administrarse con precaución a pacientes alérgicos a los Salicilatos ya que el **Paracetamol** presente en la formulación puede producir

reacciones alérgicas tipo broncoespasmo.

Es recomendable su administración durante o después de las comidas para reducir el riesgo de efectos digestivos producidos por el **Ketoprofen**. Evitar su empleo cuando existen antecedentes de úlcera péptica. En pacientes alcohólicos no sobrepasar 2 g de **Paracetamol** por día.

#### INTERACCIONES

El Probenecid retrasa la excreción del **Ketoprofeno** y disminuye su grado de unión a las proteínas, con lo que aumenta su concentración plasmática.

El **Ketoprofeno** reduce el gradiente de incremento de las concentraciones de Potasio y Cloro inducido por Hidroclorotiazida.

La administración simultánea crónica de **Paracetamol** con anticoagulantes derivados de la Cumarina puede aumentar el efecto anticoagulante de estos.

Aumenta significativamente el riesgo de aparición de nefropatía con el uso simultáneo y prolongado de Ácido Acetilsalicílico y **Paracetamol**.

#### SOBREDOSIS

Diarreas, náuseas, calambres o dolor de estómago, sudoración, lesión hepática.

#### TRATAMIENTO

Lavado gástrico. Administrar Acetil Cisteína. Controlar la función renal y hepática. Instaurar el mantenimiento del equilibrio hídrico y electrolítico.

#### RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes con trastornos hemorrágicos, pacientes sometidos a pruebas de la función tiroidea, pacientes que hayan sufrido angioedema, urticaria o rinitis desencadenadas por la administración de Ácido Acetilsalicílico u otro AINE.

#### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente a 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

#### PRESENTACIONES

Cajas conteniendo 12 comprimidos gastroprotegidos.

Cajas conteniendo frascos x 75 mL de suspensión.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

**"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**



**LABORATORIOS  
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13