

INAFLEX BIOTIC

Ketoprofen - Amoxicilina

Comprimidos Revestidos - Suspensión Extemporánea

Antiinflamatorio – Antibiótico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Ketoprofen	50 mg
Amoxicilina (como Amoxicilina trihidrato).....	500 mg
Excipientes	c.s.

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Ketoprofen	20 mg
Amoxicilina (como trihidrato).....	250 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

INAFLEX BIOTIC es la asociación de un antiinflamatorio no esteroideo, el **Ketoprofen** y un antibiótico bactericida de amplio espectro, la **Amoxicilina**. Esta asociación permite la supresión de focos infecciosos a gérmenes sensibles a la **Amoxicilina** y los procesos inflamatorios y dolorosos que acompañan a la infección.

INDICACIONES

Procesos infecciosos que cursen con dolor y/o inflamación causados por gérmenes Gram (+) y Gram (-) sensibles a la **Amoxicilina**.

Infecciones de vías respiratorias altas y bajas: sinusitis, amigdalitis, faringitis, mastoiditis, otitis, neumonías.

Infecciones urinarias: cistitis, uretritis, nefritis, pielonefritis, prostatitis.

Infecciones de piel y tejidos blandos.

Infecciones odontológicas: pulpitis, alveolitis, abscesos, granulomas, quistes, gingivitis, estomatitis, periodontitis.

Profilaxis pre-operatoria e infecciones post-quirúrgicas.

POSOLOGÍA

De referencia:

Adultos: 1 comprimido cada 8 horas.

Niños con menos de 20 Kg de peso: 2,5 a 5 mL cada 8 horas.

Niños con más de 20 Kg de peso: 5 a 10 mL cada 8 horas.

De acuerdo al criterio médico, esta dosis puede aumentarse de acuerdo a la gravedad del cuadro.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden aparecer en contados casos, rash cutáneo, vómitos, diarrea, que desaparecen al discontinuar el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda tener cuidado en pacientes con antecedentes de anafilaxia frente a las penicilinas.

El alcohol y el uso de otros AINEs pueden aumentar los efectos secundarios gastrointestinales. Puede aparecer fotosensibilidad. No se recomienda el empleo al final del embarazo a los posibles efectos adversos en el feto, tales como cierre prematuro del conducto arterioso, que puede producir hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Puede producir inflamación, irritación o ulceración de la mucosa oral. Tener precaución en pacientes geriátricos en los que puede ser más probable que se desarrollen efectos renales, hepáticos o gastrointestinales severos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la Penicilina y sus derivados. Úlcera gastroduodenal. Coagulopatías.

INTERACCIONES

El uso de **Paracetamol** en forma simultánea puede aumentar el riesgo de efectos renales adversos. Los corticoides, ACTH, Ácido Acetilsalicílico u otros AINEs pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales, incluidos úlcera o hemorragia. Reduce o revierte los efectos de muchos antihipertensivos. El **Ketoprofen** reduce el gradiente de incremento de las concentraciones de potasio y cloro inducido por hidroclorotiazida. El uso simultáneo de dipiridamol, piperacilina, ticarcilina o ácido valproico aumenta el riesgo de hemorragia. Disminuye la excreción renal del metotrexato. Se recomienda precaución con el uso de Nifedipina o Verapamilo, por que el **Ketoprofen** puede aumentar las concentraciones plasmáticas de una a otra droga. El uso simultáneo con Alopurinol puede aumentar la incidencia de rash cutáneo, sobre todo en pacientes hiperuricémicos. Los siguientes fármacos bacteriostáticos pueden interferir con los efectos bactericidas de las penicilinas: Cloranfenicol, Eritromicina, sulfamidas o tetraciclinas. Puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos.

SOBREDOSIS

Broncoespasmo, hipotensión, rash cutáneo, dolor en las articulaciones, fiebre, dolor de garganta, posiblemente reducción del volumen de orina, proteinuria, hematuria, calambres y dolor fuerte en el abdomen o el estomago, sensibilidad al dolor por presión o contacto en el abdomen, diarrea acuosa y grave, que también puede ser sanguinolenta.

TRATAMIENTO

Las reacciones anafilactoides graves requieren un tratamiento de urgencia inmediato, que consta de lo siguiente:
Epeinefrina parenteral, oxígeno, corticosteroides intravenosos.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación o con antecedentes de trastornos hemorrágicos. Enteritis regional o colitis asociada a antibióticos. Disfunción hepática, función cardíaca comprometida e hipertensión. Embarazo y lactancia.

CONSERVACIÓN

Comprimidos: Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

Suspensión: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos.

Caja conteniendo frasco con polvo para preparar 75 mL de suspensión + jeringa dosificadora.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta Simple Archivada

Paraguay

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos, Teléfono: 220-418".



LABORATORIOS
INDUFAR
División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Frdo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13