

Inducort Crono

Dexametasona Depósito

Suspensión Inyectable

Corticosteroide

Vía de Administración: Inyectable IM

FÓRMULA

Cada frasco-ampolla de 2 mL contiene:

Dexametasona (como fosfato sódico)	4 mg
Dexametasona (como 21 pivalato).....	16 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

INDUCORT CRONO es una especialidad farmacéutica con las propiedades de todos los corticosteroides a base de **Dexametasona** y que por mezcla de dos derivados le confieren acción inmediata y de depósito, para liberarse durante un periodo prolongado.

La **Dexametasona** posee efectos antiinflamatorios, antirreumáticos, antialérgicos e inmunosupresores.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Como antirreumático: Osteoartritis pos-traumática, sinovitis osteoartítica, artritis reumatoidea, bursitis aguda y sub-aguda, gota artrítica aguda, tenosinovitis, ciática, epicondilitis, espondilitis anquilosante.

Colagenosis: Lupus eritematoso sistémico, escleroderma.

Como antialérgico: Asma, rinitis, bronquitis, hipersensibilidad a medicamentos, picaduras de insectos.

Dermatología: Dermatitis exfoliativa, herpetiforme, seborréica. Psoriasis. Como antineoplásico: Manejo paliativo de leucemias y linfomas en adultos y leucemia aguda en niños.

Prevención de insuficiencia respiratoria: Se utiliza para la maduración pulmonar lo que evita la insuficiencia respiratoria del recién nacido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, intraarticular, periarticular, intrabursal, intradérmica e intralesional. No administrar por vía intravenosa o subcutánea. Agitar antes de su administración.

POSOLOGÍA

Intramuscular: Para la mayoría de las afecciones es suficiente 1 mL de INDUCORT CRONO repitiendo la dosis a la semana. Para crisis asmática o lupus serán necesarios 2 mL de entrada y ajustar la dosis hasta obtener la respuesta clínica. Para prevención de insuficiencia respiratoria en posibles partos prematuros, 1 a 2 mL 24 horas antes de la fecha estimada. Segunda dosis, 2 mL 24 horas después.

Inyección local: En la mayoría de los casos se recomienda 3 a 4 inyecciones de 1 mL cada una a intervalos de 1 a 2 semanas en la vaina del tendón afectado.

Intrabursal: 1 mL alivia el dolor y restaura el movimiento completo en pocas horas. Normalmente se necesitan varias inyecciones a intervalos de 1 a 2 semanas.

Periarticulares: 0,5 mL directamente en la lesión.

Intraarticulares: 0,25 a 2 mL dependiendo del tamaño de la articulación. Puede obtenerse alivio del dolor, sensibilidad y rigidez en 2 a 4 horas y dura 1 a 4 semanas o más.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes. Infección micótica sistémica.

REACCIONES ADVERSAS

Con la inyección local pueden aparecer lesiones en tejidos articulares o reacciones alérgicas locales. Son de incidencia menos frecuentes: visión borrosa, polidipsia, disminución del crecimiento en niños y adolescentes, escozor, dolor y hormigueo en la zona de la inyección, perturbaciones psíquicas, rash cutáneo. Durante el uso a largo plazo pueden darse: dolor o ardor abdominal, hipertensión, calambres, mialgias, náuseas y vómitos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las inyecciones intraarticulares se repetirán con una frecuencia no superior a tres semanas, luego de cada una se deberá guardar reposo. Tomar precaución en pacientes con infecciones en curso (tuberculosis u otras).

INTERACCIONES

Aumenta el riesgo de hepatotoxicidad cuando se emplea simultáneamente con dosis elevadas de Paracetamol o en tratamientos crónicos. Aumenta el riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal con los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). La Amfotericina-B parenteral puede provocar hipokalemia severa en asociación con glucocorticoides. El uso de antiácidos disminuye la absorción de la **Dexametasona**. Debido a su actividad hiperglucemiante intrínseca puede ser necesario ajustar las dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. El uso junto con glucósidos digitálicos aumenta la posibilidad de arritmias. Aumenta el metabolismo de la Mexiletina, disminuyendo su concentración plasmática. No se recomienda la administración de vacunas de virus vivos, ya que puede potenciarse la replicación de los virus de la vacuna.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco ampolla x 2 mL con 1 jeringa descartable.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535