

INDURIT

INDURIT FORTE

Espironolactona

Comprimidos 25 mg - 100 mg

Diurético - Antihipertensivo

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido de INDURIT contiene:

Espironolactona.....25 mg
Excipientes.....c.s.

Cada comprimido de INDURIT FORTE contiene:

Espironolactona.....100 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Los efectos diuréticos y antihipertensivos de la **Espironolactona** se deben a la acción de bloqueo del intercambio del Sodio por Potasio, en el túbulo distal renal, lo que da lugar a un aumento de la secreción de agua y Sodio y a retención de Potasio. La **Espironolactona** es un inhibidor competitivo de la Aldosterona. Se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad mayor que 90%. Su unión a las proteínas es muy alta (90%). Se metaboliza en el hígado con rapidez a Canrenona (metabolito activo que se elimina por vía renal).

INDICACIONES

Hipertensión esencial, estados edematosos (insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico). Diagnóstico y tratamiento en el corto y el largo plazo del hiperaldosteronismo primario.

POSOLOGÍA

ADULTOS

Como diurético: edema debido a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o síndrome nefrótico, 25 a 200 mg por día en 2 a 4 tomas al menos durante 5 días.

Mantenimiento: 75 a 400 mg al día divididos en 2 a 4 tomas. Antihipertensivo: 50 a 100 mg al día en dosis única diaria o divididos en 2 a 4 tomas, durante al menos 2 semanas seguidos de un ajuste gradual de la dosificación cada 2 semanas, según necesidades, hasta 200 mg al día.

Hiperaldosteronismo primario: 100 a 400 mg al día divididos en 2 a 4 tomas diarias antes de la cirugía. Pueden emplearse dosis más pequeñas en tratamientos de mantenimiento a largo plazo en enfermos que no se pueden operar.

REACCIONES ADVERSAS

La ginecomastia es la reacción adversa más frecuente, especialmente durante tratamientos de larga duración (2-7 meses). Con dosis de hasta 100 mg la frecuencia es del 13%. Normalmente este efecto es reversible con la suspensión del tratamiento. Pueden aparecer con frecuencia malestar, fatiga, menstruación irregular, amenorrea, sangrado post-menopáusico, impotencia, diarrea y náuseas. Inusualmente pueden aparecer neoplasia benigna en el pecho y dolor en la mama.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la excesiva ingestión de alimentos ricos en Potasio, el uso de sustitutos de la sal u otros suplementos de Potasio. En los ancianos puede haber mayor riesgo de desarrollar hiperpotasemia.

Puede potenciar la acción de las drogas antihipertensivas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la droga presente en la formulación. Insuficiencia renal aguda, deterioro de la función renal, anuria e hiperpotasemia.

INTERACCIONES

El uso de Cloruro de Amonio puede producir acidosis sistémica. Puede disminuir el efecto antihipertensivo al asociar con estrógenos, AINES o drogas simpaticomiméticas. La Dopamina puede aumentar el efecto diurético.

SOBREDOSIS

- Calambres de estómago.
- Diarreas.
- Hiponatremia.
- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Latidos cardíacos irregulares.
- Sensación de falta de aire.

TRATAMIENTO

- Evacuación inmediata del estómago.
- Monitorización de las concentraciones séricas de electrolitos y de la función renal.
- Tratamiento sintomático de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

No se ha establecido la seguridad del medicamento durante el embarazo. La Canrenona se excreta en la leche materna. Si es esencial la administración de **Espironolactona** debe instituirse otro método de alimentación para el lactante.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

INDURIT: Caja conteniendo 50 comprimidos.
INDURIT FORTE: Caja conteniendo 50 comprimidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en las calles Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

 **MEDICAMENTOS
CARDIOLÓGICOS**
División de **INDUFAR CISA**
Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535