

# Justum

## Cefadroxilo

Comprimidos Revestidos 500 mg - 1 g  
Suspensión Extemporánea 500 mg/5 mL

Antibiótico bactericida de amplio espectro

Vía de Administración: Oral

### FÓRMULAS

Cada comprimido revestido de JUSTUM contiene:  
Cefadroxilo (como monohidrato).....500 mg.  
Excipientes.....c.s.

Cada comprimido revestido de JUSTUM 1 g contiene:  
Cefadroxilo (como monohidrato).....1 g.  
Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de JUSTUM 500 suspensión contiene:  
Cefadroxilo (como monohidrato).....500 mg.  
Excipientes: Benzoato de Sodio 5 mg; Azúcar 2306,70 mg; Otros Excipientes c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

**Cefadroxilo** es una cefalosporina de primera generación y como tal, ejerce eficaz acción bactericida sobre gérmenes Gram (+) (incluyendo a productores de penicilinas) y Gram (-) (sobre todo actúa sobre bacilos entéricos como *E. coli*, *K. pneumoniae* y *Proteus mirabilis*), mediante la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Además, se inhiben la división y crecimiento celular, frecuentemente se producen lisis y elongación de las bacterias sensibles. El **Cefadroxilo** varía considerablemente en cuanto a su biodisponibilidad (15 a 86%), fijación proteica (14 a 96%) y vida media 10 a 45 minutos. Se distribuyen ampliamente en todo el organismo y alcanzan concentraciones terapéuticas en la mayoría de los tejidos y líquidos corporales incluyendo el sinovial, pericárdico, pleural y peritoneal, también en la bilis, esputo y orina. Así mismo se distribuyen en el hueso, miocardio, vesícula biliar, piel y tejidos blandos. Cruzan la placenta y pasan a la leche materna. La mayor parte de la eliminación se cumple mediante filtración glomerular y secreción tubular y el resto por cierta secreción biliar.

**Cefadroxilo** alcanza niveles plasmáticos más sostenidos que la Cefalexina, lo que permite una cómoda posología, con tomas más espaciadas (cada 12 horas). La absorción de JUSTUM no es afectada por la ingestión de alimentos por lo cual las posibilidades de náuseas disminuyen cuando este producto es ingerido con las comidas. JUSTUM resiste a la inactivación por beta-lactamasas; proporciona altas y prolongadas concentraciones en plasma, orina, líquidos y tejidos corporales. Ofrece alta actividad antibacteriana con muy baja toxicidad.

### INDICACIONES

JUSTUM está indicado en todos los procesos infecciosos bacterianos de cualquier localización, cuyos agentes causales sean sensibles a la acción de este parahidroxi derivado de la Cefalexina: faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, bronquitis, neumonías, uretritis, cistitis, anexitis, prostatitis, forunculosis, pielitis, abscesos.

### POSOLOGÍA

Adultos y niños de más de 40 Kg de peso:

La dosis de referencia es de 1 comprimido de 500 mg a 1 g (5 a 10 mL de JUSTUM 500 suspensión) cada 12 horas.

Esta dosis puede ser incrementada conforme a la severidad del cuadro

hasta 4 g diarios en dos o más tomas.

**Adultos y niños de menos de 40 Kg de peso:**

25 a 100 mg/Kg peso/día repartidos en dos tomas de acuerdo a la gravedad de la afección.

### CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad comprobada a los derivados cefalosporínicos y a la penicilina. Alcoholismo. Durante el tratamiento con bacteriostáticos (Tetraciclinas, Cloranfenicol, Sulfamidas y Aminoglucósidos) y durante el tratamiento con Probenecid.

### REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente, puede que algunos pacientes presenten síntomas de colitis, náuseas o vómitos.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Sensibilidad a la droga y/o penicilina. En insuficiencia renal grave. Se debe cuidar el uso de JUSTUM durante el tratamiento con agentes bacteriostáticos y nefrotóxicos.

La experiencia clínica con **Cefadroxilo** en pacientes embarazadas, no ha aportado aún resultados concluyentes, por lo que su empleo en estos casos, queda a criterio exclusivo del médico. El cefadroxilo se secreta en la leche materna, por lo que no debiera administrarse a mujeres que amamantan. "Este medicamento contiene Lactosa". Si el médico le ha indicado que padece de intolerancia a ciertos azúcares, consulte antes de tomar este medicamento.

### SOBREDOSIS

Reacciones gastrointestinales, colitis pseudomembranosa, crisis convulsiva, hipoprotrombinemia.

### TRATAMIENTO

No existe ningún antídoto específico. El tratamiento a aplicarse debe ser sintomático y de apoyo.

En los casos de crisis convulsiva deberá administrarse anticonvulsivantes.

### RESTRICCIONES DE USO

Pacientes con hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas, embarazo, Lactantes.

### CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

### PRESENTACIONES

Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos de JUSTUM 500 mg

Frasco conteniendo polvo para preparar 75 mL de suspensión oral JUSTUM 500

Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos de JUSTUM 1g

Manténgase fuera del alcance de los niños

Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada

Bolivia: Venta Bajo Receta.

### Paraguay

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535