

# Kandizol Duo

1 cápsula de Fluconazol 150 mg  
4 Comprimidos Revestidos de Secnidazol 500 mg

Antimicótico de amplio espectro  
Tricomónica – Antibacteriano

Vía de Administración: Oral

## FÓRMULA

Cada cápsula contiene:

Fluconazol.....150 mg

Excipientes.....c.s.

Cada comprimido revestido contiene:

Secnidazol.....500 mg

Excipientes.....c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

KANDIZOL DUO es una asociación medicamentosa altamente efectiva por vía oral, que combina la acción antimicótica del **Fluconazol** con la actividad tricomónica y antibacteriana del **Secnidazol**. Ofrece una forma de administración cómoda y simple permitiendo la toma total del medicamento en un solo día.

## INDICACIONES

Tratamiento práctico oral de pacientes femeninas con flujo vaginal anormal de etiología infecciosa, producida por *Candida albicans* y otras especies de *Candida*, *Tricomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis* y otros gérmenes anaerobios, agentes más frecuentes en la mayoría de los flujos vaginales y vulvovaginitis infecciosa.

## POSOLOGÍA

**Fluconazol 150 mg:** tomar la cápsula por la mañana en ayunas.

**Secnidazol 500 mg:** tomar los 4 comprimidos de 500 mg (2 g) en dosis única, preferentemente a la noche, con la cena. En caso de no poder ingerir los comprimidos de una sola vez, se puede tomarlos a intervalos de pocos minutos, nunca superior a 30 minutos, para evitar comprometer la eficacia del tratamiento.

Se recomienda el tratamiento simultáneo de la pareja con la misma dosis, de manera a evitar reinfección.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al **Fluconazol** o a otros compuestos azólicos relacionados. Hipersensibilidad conocida al **Secnidazol** u otros derivados imidazólicos. Discrasias sanguíneas.

## REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente náuseas, cefaleas, dolores abdominales, modificaciones del gusto, glositis, estomatitis. Urticaria, erupciones cutáneas. Leucopenia moderada, que revierte al suspender el tratamiento. Raramente polineuritis sensitivo-motora, vértigo, ataxia, parestesias.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar bebidas alcohólicas durante el tratamiento y hasta 4 días después de la administración. Precaución especial en pacientes que reciben tratamiento con anticoagulantes orales y Disulfiram. Se recomienda evitar su uso en pa-

cientes con antecedentes de discrasias sanguíneas y disturbios neurológicos.

## INTERACCIONES

- Tanto el **Fluconazol** como el **Secnidazol** pueden potencializar los efectos de los anticoagulantes orales, especialmente de la Warfarina, incrementando el riesgo de hemorragia por disminución de su catabolismo hepático, por lo que se debe monitorizar el tiempo de protrombina hasta 8 días después de haber finalizado el tratamiento.

- El **Fluconazol** puede prolongar la vida media de los hipoglucemiantes orales y presentar un episodio hipoglucémico.

- La administración concomitante de **Fluconazol** y Fenitoína puede incrementar los niveles de ésta en grado clínicamente significativo, los niveles de Fenitoína deberán ser monitoreados y ajustada la dosis para mantener los niveles terapéuticos.

- El **Secnidazol** administrado concomitantemente con Disulfiram puede causar confusión, episodios de delirio.

## SOBREDOSIS

Pueden manifestarse síntomas como: náuseas, vómitos. Alucinaciones y cuadros paranoides, que ceden en 48 horas luego de suspender el tratamiento.

## TRATAMIENTO

- Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

- Inducción de emesis, tratamiento con carbón activado.

- Lavado gástrico.

## RESTRICCIONES DE USO

Se debe evaluar la relación riesgo/beneficio en pacientes con disfunción renal dado que, tanto el **Fluconazol** como el **Secnidazol** son excretados principalmente a través del riñón.

En vista de la ausencia de datos en humanos sobre mutagénesis, carcinogénesis y alteraciones en la fertilidad no se recomienda el uso de KANDIZOL DUO durante el embarazo.

No se recomienda el uso de KANDIZOL DUO durante el periodo de lactancia, debido a que se ha encontrado **Fluconazol** en leche materna en concentraciones similares a las plasmáticas.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 blister con 1 cápsula y 1 blister con 4 Comprimidos Revestidos

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535