

LOMED-D

Desloratadina - Pseudoefedrina

Comprimidos Revestidos de Acción Sostenida

Jarabe

Descongestivo - Antialérgico
Antihistamínico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULAS

Cada comprimido revestido de acción sostenida de LOMED-D contiene:

Desloratadina.....5 mg
Pseudoefedrina Sulfato.....120 mg
Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de LOMED-D JARABE contiene:

Desloratadina.....2,5 mg
Pseudoefedrina Sulfato.....60 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

LOMED-D asocia a la **Desloratadina**, antagonista no sedante de la Histamina, que posee actividad antialérgica prolongada intrínseca y a la **Pseudoefedrina**, descongestivo rino-sinusal-faríngeo de acción rápida.

La **Desloratadina** ha demostrado débil afinidad por los receptores de membrana cerebrales y difícilmente penetra el SNC. En tratamientos prolongados no se han observado modificaciones clínicamente significativas de los signos vitales, de los valores de laboratorio y de los resultados de los exámenes psíquicos y EEG.

La **Pseudoefedrina** Sulfato es un simpaticomimético con actividad alfa-mimética predominante en relación a la actividad beta-mimética. Por su acción vasoconstrictora es un descongestionante nasal activo por vía oral.

INDICACIONES

LOMED-D está indicado para el alivio de los síntomas nasales y no nasales asociados con la rinitis alérgica y el resfriado común: estornudos, rinorrea, congestión, prurito nasal y lagrimeo.

POSOLOGÍA

Comprimidos:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido revestido de acción sostenida 2 veces al día. Se recomienda beber un poco de agua luego de la administración.

Jarabe:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL de jarabe 2 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 5 mL de jarabe 2 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 2,5 mL de jarabe 2 veces al día.

Administrar de preferencia a la misma hora del día.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse sequedad bucal, fatiga, anorexia, insomnio, taquicardia, nerviosismo, confusión, cefalea, náuseas, vértigos y dispepsia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave. No se recomienda su uso durante el embarazo y periodo de lactancia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a las drogas presentes en la formulación. Glaucoma de ángulo estrecho. Retención urinaria. Hipertensión severa. Coronariopatía grave. Hipertiroidismo.

INTERACCIONES

Las concentraciones plasmáticas de **Desloratadina** tienden a aumentar al administrar con Ketoconazol, Eritromicina y Azitromicina.

Los antiácidos aumentan la tasa de absorción de la **Pseudoefedrina**. Los efectos de la medicación antihipertensiva pueden ser menores con la **Pseudoefedrina**. La **Desloratadina** no potencia los efectos del alcohol.

SOBREDOSIS

Cefalea, Mareo, hipertensión, taquicardia, nerviosismo e inquietud.

TRATAMIENTO

El tratamiento deberá ser de mantenimiento y de sostén.

Vómito provocado o lavado gástrico, administración de carbón activado y/o purgante.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo: No hay datos del uso de la combinación de **Desloratadina** y Sulfato de **Pseudoefedrina** en mujeres embarazadas. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de LOMED-D durante el embarazo.

Lactancia: Se ha detectado tanto **Desloratadina** como Sulfato de **Pseudoefedrina** en recién nacidos lactantes de madres tratadas. Se ha notificado disminución en la producción de leche materna en mujeres en periodo de lactancia con Sulfato de **Pseudoefedrina**. LOMED-D no debe utilizarse durante la lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 10 comprimidos revestidos de acción sostenida.

Caja conteniendo frasco x 100 mL de jarabe.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13