

LANSOMED

LANSOPRAZOL 30 mg

Cápsulas

Antiulceroso

Vía de administración: Oral

FÓRMULA

Cada cápsula contiene:

Lansoprazol.....30 mg

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Lansoprazol es un fármaco antiulceroso, inhibidor de la secreción ácida gástrica, que ejerce su acción mediante la inhibición específica del sistema enzimático ATPasa H⁺/K⁺ en la superficie secretoria de las células parietales gástricas, es decir que bloquea el último paso en la producción de ácido. Su acción es rápida y produce la disminución de la secreción de ácido del estómago con solo una dosis diaria.

INDICACIONES

Tratamiento de la dispepsia ácida. Tratamiento a corto plazo y de mantenimiento de la úlcera duodenal y gástrica benigna. Prevención y tratamiento de úlceras gástricas y duodenales asociadas al tratamiento con AINEs, esofagitis por reflujo. Tratamiento de los estados de hipersecreción gástrica patológica incluyendo el síndrome de Zollinger-Ellison y como coadyuvante en la erradicación de *Helicobacter pylori*.

POSOLOGÍA

Dispepsia ácida: 1 cápsula (30 mg) una vez al día, durante 2 a 4 semanas.

Úlcera duodenal: 1 cápsula (30 mg) una vez al día, durante 2 semanas. En caso que no se logre la curación completa en este plazo, debe continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 2 semanas más.

Úlcera gástrica benigna: 1 cápsula (30 mg) una vez al día durante 4 semanas. En caso que no se logre la curación completa en este plazo, debe continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 4 semanas más.

Esofagitis por reflujo: 1 cápsula (30 mg) una vez al día durante 4 semanas. De no obtenerse la curación completa en este plazo puede continuarse el tratamiento durante 4 semanas más.

Úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas al tratamiento con AINEs: 1 cápsula (30 mg) una vez al día durante 4 semanas. De no obtenerse la curación completa, el tratamiento puede continuarse durante 4 semanas más.

Hipersecreción gástrica patológica/Síndrome de Zollinger-Ellison: 2 cápsulas (60 mg) una vez al día. La dosis debe ajustarse individualmente y el tratamiento debe continuarse durante el tiempo que sea necesario. Se han empleado dosis diarias de hasta 180 mg. Si la dosis diaria es superior a 120 mg, debe administrarse en 2 dosis fraccionadas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al **Lansoprazol** o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Úlceras gástricas de origen neoplásico o sin diagnóstico definido.

REACCIONES ADVERSAS

Las más frecuentes (>1%) son: dolor abdominal, constipación, diarrea, náuseas, cefalea.

Con menor frecuencia (<1%) se han reportado: astenia, distensión abdominal, dispepsia, anorexia, vómitos, flatulencia, sequedad o dolor bucal o faríngeo, eructos, aumento del apetito, aumento de la salivación, rash cutáneo, urticaria, prurito, angioedema y broncoespasmo.

Raremente se han reportado: anafilaxia, trombocitopenia, eosinofilia y leucopenia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de úlcera gástrica se recomienda verificar la benignidad de las lesiones

antes de iniciar el tratamiento, ya que se pueden enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico.

También se debe excluir una enfermedad maligna del esófago antes de iniciar el tratamiento de la esofagitis por reflujo. **Lansoprazol** debe emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave. Si se emplea **Lansoprazol** asociado a antibióticos como Clantromicina y/o Amoxicilina para la erradicación de *H. pylori*, deben seguirse también las instrucciones sobre el empleo de estos antibióticos.

INTERACCIONES

La administración concomitante de **Lansoprazol** y Ketoconazol e Itraconazol puede dar lugar a concentraciones subterapéuticas de Ketoconazol e Itraconazol, por lo que debe evitarse su asociación. La administración concomitante de **Lansoprazol** y Digoxina puede aumentar la concentración plasmática de Digoxina, por lo que se debe vigilar la concentración plasmática de Digoxina y si es necesario, ajustar la dosis de éste fármaco al inicio y al final del tratamiento con **Lansoprazol**. **Lansoprazol** reduce la concentración plasmática de Teofilina, lo que puede dar lugar a una reducción del efecto clínico previsto a una determinada dosis. La administración conjunta de **Lansoprazol** y Atazanavir produce una reducción sustancial de la exposición de Atazanavir (una disminución aproximada del 90% en los valores AUC y C_{max}). Al asociar **Lansoprazol** al inhibidor de CYP2C19, Fluvoxamina, debe considerarse una reducción de la dosis de **Lansoprazol**, debido a un aumento de su concentración plasmática. La administración simultánea con Sucralfato puede retrasar la absorción y disminuir la biodisponibilidad de **Lansoprazol**, por lo que se recomienda administrar el **Lansoprazol** previo (por lo menos 30 minutos antes) a la toma de Sucralfato.

SOBREDOSIS

No han sido reportado casos de sobredosis de **Lansoprazol** en humanos.

TRATAMIENTO

Si ocurriera se recomienda: control clínico, tratamiento sintomático y de mantenimiento, vaciado gástrico, administración de carbón activado.

RESTRICCIONES DE USO

No debe ser administrado durante el embarazo, salvo que sea necesario y que los beneficios potenciales para la madre superen los riesgos potenciales para el feto. No debe ser administrado durante la lactancia, salvo que el médico considere que su uso es esencial para la madre, en este caso deberá evaluar la posibilidad de interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admittida entre 15°C y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 cápsulas.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en las calles Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

Elaborado por:
TITAN LABORATORIES PVT. LTD.
E-27/1, E-27/2, M.I.D.C.
Mahad, Distrito de Raigad - India

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí el Zaevedra y Bella
Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay.
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Envasado y Fraccionado por:
MEDICAL FARMACÉUTICA