

MICAD

Nistatina 100.000 UI/mL

Suspensión Oral
Anticandidiásico específico
de uso oral

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada mL de MICAD SUSPENSION ORAL contiene:

Nistatina.....100.000 U.I.

Excipiente..... C.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

MICAD es un antibiótico poliélico que se obtiene a partir del *Streptomyces Noursei*, con marcada acción antimicótica específica sobre la *Candida Albicans*.

MICAD actúa provocando la muerte del hongo producida por vesiculación y formación de cráteres en la membrana celular del mismo. MICAD, administrado por vía oral, se absorbe escasamente por el tracto digestivo, y la mayor parte no absorbida se elimina en la heces en forma inalterada o activa.

INDICACIONES

MICAD Suspension Oral está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por *Candida Albicans*, cuando se localiza en cavidad bucal de los lactantes (muguet) y niños o en las infecciones del tracto intestinal de lactantes y niños menores.

POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio médico, y recurriendo al gotero correspondiente, se sugiere:

LACTANTES: 1 o 2 mL, tres o cuatro veces al día.

NIÑOS Y ADULTOS: 4 a 6 mL, tres o cuatro veces al día.

Se recomienda retener la suspensión en la cavidad bucal por algunos minutos y luego tragarla, a fin de eliminar los hongos presentes en el intestino.

Seguir el tratamiento hasta 48 horas después de haber logrado la desaparición de los síntomas, a fin de evitar recaídas.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad o alergia conocida a la **Nistatina**. Por lo general MICAD es atóxico, no sensibilizante y bien tolerado.

REACCIONES ADVERSAS

Molestias gastrointestinales tales como diarreas, náuseas, vómitos, dolor de estómago.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda cumplir el ciclo completo de tratamiento para evitar las recaídas. Continuar el tratamiento durante 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido y los cultivos vuelvan a ser normales. Se recomienda retener la suspensión en la cavidad bucal el mayor tiempo posible antes de tragarla.

INTERACCIONES

Por ser un fármaco que no se absorbe no presenta interacciones.

SOBREDOSIS

Las dosis en exceso de 5 millones de U.I/ mL al día han provocado náuseas y molestias gastrointestinales.

TRATAMIENTO

Sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

No debe prescribirse durante el embarazo a menos que el beneficio para la madre sea mayor que el riesgo para el feto.

Aún cuando la absorción gastrointestinal es insignificante se debe tener precaución cuando se utiliza durante la lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco x 60 mL de suspensión oral con gotero dosificador.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Venta Bajo Receta Simple Archivada.

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13