Meticol Compuesto

**Loperamida - Neomicina - Ftalilsulfatiazol
Dimetilpolisiloxano**

Comprimidos Revestidos

Antidiarreico - Antibacteriano - Antiflatulento

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido de METICOL COMPUESTO contiene:
Loperamida Clorhidrato.....2 mg
Neomicina (como sulfato).....50 mg
Ftalilsulfatiazol.....500 mg
Dimetilpolisiloxano.....50 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

METICOL COMPUESTO está elaborado a base de un antibiótico de amplio espectro y una sulfonamida, los cuales no se absorben sino que actúan con preferencia a nivel de la mucosa intestinal (acción local), eliminando a los gérmenes Gram (+) y Gram (-) causantes de infecciones entéricas.

METICOL COMPUESTO, contiene además un depresor del peristaltismo intestinal que en las diarreas está acelerado. Por último, se incluye un potente y eficaz antiflatulento, el **Dimetilpolisiloxano**.

INDICACIONES

Diarreas agudas y crónicas de cualquier etiología. Gastroenteritis, colitis, disentería bacteriana, etc.

POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio médico:

Niños de 6 a 12 años y Adultos: 2 comprimidos revestidos al principio y luego 1 comprimido revestido cada 4 horas.

REACCIONES ADVERSAS

Distensión abdominal, náuseas, vómitos. Síndrome de mal absorción (aumento de la cantidad de gases, heces de color blanco). Rash cutáneo, anorexia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En los pacientes con colitis ulcerosa se debe suspender de inmediato el tratamiento con **Loperamida**, ante la aparición de distensión abdominal u otros síntomas que pudieren indicar megacolon tóxico inminente. En la diarrea aguda se debe suspender el tratamiento con **Loperamida** después de 48 horas si no se produce mejoría. En la diarrea crónica si no se produce alivio con al menos 10 días de tratamiento con la dosis máxima. En ancianos se recomienda tener precaución debido al riesgo de pérdida de líquidos y electrolitos.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación.

En pacientes con cuadros de deshidratación, colitis severa, diarrea asociada con colitis pseudomembranosa resultante del tratamiento con antibióticos y disfunción hepática.

INTERACCIONES

El uso simultáneo de **Loperamida** con un analgésico opiáceo puede aumentar el riesgo de estreñimiento grave.

Al administrar simultáneamente con aminoglucósidos puede aumentar la ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular.

La **Neomicina** puede potenciar el efecto de la Warfarina alterando la producción de Vitamina K por la flora intestinal, con lo cual disminuye la disponibilidad de dicha vitamina.

SOBREDOSIS

Mareos, somnolencia, sequedad de boca, dolor fuerte de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, disfunción abdominal.

TRATAMIENTO

Administrar carbón adsorbente lo antes posible. Lavado gástrico si no se ha producido vómito, respiración asistida, monitorización prolongada y cuidadosa.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Simple Archivada

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535