

Micofung

Ketoconazol

20 mg/g

Crema

Antimicótico de uso tópico

Vía de administración: Tópica

FÓRMULA

Cada gramo de **MICOFUNG** crema contiene:

Ketoconazol..... 20 mg

Excipientes..... c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

MICOFUNG crema ejerce eficaz acción antimicótica por su contenido en **Ketoconazol**, un derivado del Imidazol, de reconocida actividad contra hongos patógenos, dermatofitos, levaduras, etc. El **Ketoconazol** es una droga fungistática, que puede ser fungicida, según su concentración. Inhibe la biosíntesis de ergosterol u otros esteroides, lesionando la membrana de la pared celular del hongo y alterando su permeabilidad, inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos de los hongos y la actividad enzimática oxidativa y peroxidativa, dando como resultado un acúmulo intracelular de concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo que puede contribuir al deterioro de los orgánulos subcelulares y a la necrosis celular.

No se detecta absorción sistémica durante el período de 72 horas que sigue a su aplicación tópica.

INDICACIONES

Tratamiento local de las micosis superficiales. Dermatomicosis. Pie de atleta. Tiña capitis. Tiña cruris. Intertrigo. Pitiriasis versicolor. Onicomiosis.

POSOLOGÍA

Aplicar una delgada capa de crema en las zonas afectadas, a 3 veces al día, frotando suavemente para una mejor absorción por la piel.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo y a los componentes del producto.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse prurito, picor o irritación ausentes antes del tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe usarse para tratamientos oftálmicos. En nivel dérmico puede producir dermatitis o sensación de quemazón durante el tratamiento.

INTERACCIONES

No se han registrado interacciones por vía tópica del **ketoconazol**.

SOBREDOSIS

- Hinchazón.
- Enrojecimiento
- Escozor.

TRATAMIENTO

Puesto que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

RESTRICCIONES DE USO

Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio al administrar a personas sensibles al miconazol o a otros antifúngicos del grupo de los azoles debido a que pueden serlo también al **ketoconazol**.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Pomos conteniendo 20 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en las calles Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535