

Mercilop Etamsilato

Comprimidos 500 mg

Vía de Administración: Oral

Inyectable 250mg/ 2mL

Vía de Administración: Inyectable IM-IV

Hemostático

Normalizador de la Función Plaquetaria

FÓRMULA

Cada ampolla de 2 mL de MERCILOP INYECTABLE contiene:

Etamsilato250 mg

Excipientes.....c.s.

Cada comprimido de MERCILOP contiene:

Etamsilato500 mg

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPEÚTICA

MERCILOP es un antihemorrágico y protector vascular de síntesis que ejerce su acción en el primer tiempo de la coagulación (interacción endotelio-capilar), mejorando la adhesividad plaquetaria y otorgando mayor resistencia capilar. De esta manera limita la cantidad de pérdida sanguínea. MERCILOP no influye en la fibrinólisis ni sobre los factores plasmáticos de la coagulación. No tiene actividad vasoconstrictora. Carece de efectos trombógenos.

FARMACOCINÉTICA

Después de su administración por vía oral se absorbe en el tracto gastrointestinal, obteniendo una concentración máxima a las 4 horas, tiene una vida media de 3 horas y 1/2 aproximadamente. Se elimina por vía urinaria el 72 % dentro de las 24 horas siguientes a la administración sin modificarse.

Cuando se utiliza por vía intravenosa, la concentración máxima se alcanza a los 10 minutos con una vida media de 1,9 horas, eliminándose el 85% de la dosis por vía urinaria en las primeras 24 horas sin modificarse.

INDICACIONES

CIRUGÍA: Profilaxis y tratamiento de las hemorragias en sábanas, durante o después de las intervenciones en tejidos delicados o muy vascularizados: ginecología, obstetricia, O.R.L., odontostomatología, urología, oftalmología, cirugía plástica.

CLÍNICA MÉDICA: Hemorragias capilares de cualquier localización y origen, (hematurias, hematemesis, melena, epistaxis, gingivorragia, hemorragia por dispositivo intrauterino, metrorragia, menorragia, etc.

NEONATOLOGÍA: Profilaxis de la hemorragia periventricular del recién nacido prematuro.

POSOLÓGIA

INYECTABLE ADULTOS:

Premedicación: Administrar 1-2 ampollas (IM - IV) 1 hora antes de la intervención.
Durante la intervención: Si es necesario, repetir la inyección de 1 - 2 ampollas para mejorar la calidad de la hemostasia.

Después de la intervención: Para evitar riesgo de hemorragia post-operatoria, 1 ampolla cada 4-6 horas. En caso de hemorragia actual, inyección inmediata de 1 - 2 ampollas (IM -IV) y luego una ampolla cada 6 horas, mientras persiste el peligro de hemorragia.

En aplicación local: Luego de la extracción dental, aplicar en el alveolo con una torunda empapada con el contenido de 1 ampolla. De ser necesario se puede repetir el tratamiento.

Nota: El poco volumen de la ampolla permite inyectar 2 de una sola vez sin inconveniente alguno.

INYECTABLE NIÑOS: Mitad de dosis.

INYECTABLE NEONATOLOGÍA: 10 mg/kg de peso (0,1 mL contiene 12,5 mg) por vía IM en las 2 horas posteriores al nacimiento, luego cada 6 horas por 4 días.

COMPRIMIDOS ADULTOS:

Prequirúrgico: 1 comprimido (500 mg) 1 hora antes de la cirugía.

Posquirúrgico: 1 comprimido (500 mg) cada 4-6 horas en tanto persista el riesgo de hemorragia.

Medicina interna: Generalmente 1 comprimido 2-3 veces al día (1,000-1,500 mg) ingerir poca agua, la duración del tratamiento depende de los resultados obtenidos.

Ginecología, meno-metrorragia: 1 comprimido 3 veces al día (1,500 mg) ingerir con poca agua. El tratamiento dura 10 días e inicia 5 días antes del inicio esperado de la menstruación.

COMPRIMIDOS NIÑOS: Debido a su elevada concentración del principio activo, MERCILOP no es apropiado para niños.

COMPATIBILIDAD

En la fase post-operatoria, aconsejamos su administración en perfusión glucosada o salina. Puede administrarse conjuntamente con cualquier terapéutica (sin embargo no debe mezclarse productos diferentes en una misma jeringa).

REACCIONES ADVERSAS

Náuseas, cefalea, erupción cutánea, gastralgia. La mayoría de estos síntomas desaparecen espontáneamente. La administración intravenosa rápida puede producir una caída leve de las cifras de tensión arterial.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe administrarse antes pero no después de la infusión de expansores plasmáticos de alto peso molecular. Si se administra para atenuar hemorragias menstruales muy abundantes y/o muy largas sin que se observe una mejoría con el tratamiento, debe investigarse eventuales causas patológicas y excluirse de las mismas. Se recomienda aplicarlo en forma lenta.

CONTRAINDICACIONES

Porfiria aguda, asma bronquial, hipersensibilidad comprobada a sulfitos. No administrar MERCILOP durante el primer trimestre del embarazo y lactancia.

INTERACCIONES

Con excepción de la interacción del **Etamsilato** con solución de dextrano para uso parenteral, hasta la fecha no se han encontrado otras interacciones medicamentosas.

SOBREDOSIS

Cefaleas intensas, hipotensión, rash cutáneo.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Se recomienda prudencia en caso de uso durante el embarazo. No se recomienda su uso durante el periodo de lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente a 25° C. Variación admitida entre 15 y 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 2 ampollas x 2 mL.

Caja conteniendo 10 comprimidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535