

MEMOVITAL MAGNESIADO

Jarabe

Tónico energizante y revitalizador psico-físico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Cloruro de Magnesio.....	10 g
Glicerofosfato de Magnesio.....	1 g
Glicerofosfato de Sodio.....	2 g
Glicerofosfato de Potasio.....	1 g
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

MEMOVITAL MAGNESIADO es un tónico energizante y revitalizador. Tonifica el Sistema Nervioso y neuromuscular. Estimulante de la memoria. Revitalizador cerebral. El Magnesio además, frena la agregación plaquetaria, combate las alteraciones psíquicas, como el insomnio, confusión mental, apatía, desorientación, alucinaciones.

INDICACIONES

Estados de agotamiento físico y psíquico, surmenaje, bajo rendimiento escolar, stress, ejercicios físicos extenuantes (atleta).

El Magnesio debe administrarse en mujeres que consumen anticonceptivos. Además el Magnesio, previene la formación de cálculos (piedras), y las personas con diarreas profusas deben ingerir dicho elemento. Los alcohólicos agudos y crónicos deben complementar su dieta con Magnesio. Los problemas de piel, alergias, etc. mejoran considerablemente en presencia del Magnesio, lo mismo puede decirse de personas con colesterol elevado en la sangre, sin olvidar la mejoría de las manifestaciones arterioescleróticas que experimentan gracias a este agente terapéutico.

POSOLOGÍA

Niños: 5 mL, 3 veces al día.

Adultos: 10 mL, 3 veces al día.

REACCIONES ADVERSAS

Diarreas, náuseas, vómitos o dolor de estómago. Aumento del Magnesio en sangre en pacientes con insuficiencia renal grave que se manifiesta con: Somnolencia, diplopía, mareo, debilidad muscular, disminución de la tensión arterial.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Tomar después de las comidas o con alimentos para reducir al mínimo

molestias gástricas o la acción laxante. Se recomienda además ingerir gran cantidad de líquido durante su administración.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con insuficiencia renal grave por riesgo de hipermagnesemia, cardiopatías severas, arritmias, hiperfosfatemias, coma diabético, diarrea crónica, colitis ulcerosa, miastenia grave.

INTERACCIONES

La ingesta elevada de alcohol o de glucosa aumenta la excreción urinaria del Magnesio.

El uso simultáneo de laxantes o antiácidos (que contengan Magnesio) puede producir toxicidad por Magnesio, especialmente en pacientes con insuficiencia renal.

El **Cloruro de Magnesio** puede disminuir la absorción de las tetraciclinas.

Al administrar concomitantemente glicerofosfatos con Calcio puede aumentar el riesgo de depósito de Calcio en tejidos blandos.

Los Fibratos en el salvado y cereales integrales al consumirse simultáneamente con la administración de glicerofosfatos puede ligar el fosfato e impedir su absorción.

SOBREDOSIS

Diarreas intensas, dolor de cabeza, mareos, latidos cardíacos irregulares o lentos, sensación o falta de aire.

TRATAMIENTO

Suspender la administración del jarabe. Corregir las concentraciones deficitarias de electrolitos en suero. Respiración asistida.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes sensibles al potasio, al sodio, al magnesio. Enfermedad renal grave. Hipoparatiroidismo.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15° C a 30° C).

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 240 mL de Jarabe.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Libre en Farmacias

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13