

# MENTOVICK

**Dextrometorfan - Fenilefrina**

**Clorfeniramina**

**Jarabe**

**Antitusivo - Descongestivo - Antialérgico**

**Vía de administración: Oral**

## FÓRMULA

Cada 5 mL contiene:

Dextrometorfan HBr.....	10 mg
Fenilefrina HCl.....	4 mg
Clorfeniramina Maleato.....	1 mg
Excipientes.....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

MENTOVICK Jarabe, contiene **Dextrometorfan**, eficaz inhibidor del reflejo de la tos, **Fenilefrina**, descongestivo de la mucosa rinofaríngea, de acción rápida y prolongada. Completa la fórmula la **Clorfeniramina**, potente antihistamínico de escasa acción sedante.

## INDICACIONES

MENTOVICK Jarabe, está indicado en afecciones respiratorias en que existe tos y congestiones nasofaríngeas. Ejerce una efectiva acción en los cuadros alérgicos de las vías respiratorias superiores como: rinitis, faringitis, sinusitis.

## POSOLOGÍA

Adultos: 15 mL cada 6 - 8 horas.

Niños mayores: 5 mL cada 6 - 8 horas.

Niños menores: 2,5 mL cada 6 - 8 horas.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación. Disfunción hepática. Embarazo, Lactancia. Obstrucción del cuello vesical. Bloqueo cardíaco. Taquicardia ventricular.

## REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse mareos, somnolencia, náuseas, vómitos, gastralgias. Debilidad no habitual, nerviosismo y sequedad de boca o nariz.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si la tos persiste después de haber utilizado el medicamento durante 7 días o si con la tos se presenta fiebre elevada, rash cutáneo o cefalea constante, deberá consultarse al médico.

Debe medicarse con cuidado en casos de pacientes alcohólicos, en los tratados con inductores enzimáticos o con drogas consumidoras de glutatión.

Tener precaución si se produce somnolencia. Evitar la ingestión de alcohol u otros depresores de SNC durante el periodo. No debe utilizarse en pacientes con grave daño hepático o renal.

## INTERACCIONES

El alcohol, los antidepresivos tricíclicos y los depresores del SNC pueden potenciar los efectos depresores de la **Clorfeniramina**. También hipotensión con **Dextrometorfan**.

Los IMAO pueden prolongar los efectos antimuscarínicos y depresores del SNC de la **Clorfeniramina**.

Pueden bloquear la respuesta presora a la **Fenilefrina** los bloqueantes alfaadrenérgicos.

El uso simultáneo del **Dextrometorfan** y medicamentos depresores del SNC potencian los efectos depresores.

## SOBREDOSIS

Alucinaciones. Insomnios. Inquietud o irritabilidad no habituales. Náuseas y vómitos. Palpitaciones y cefalea.

## TRATAMIENTO

Mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Tratamiento sintomático y de mantenimiento. Monitorizar el estado cardíaco.

## RESTRICCIONES DE USO

Sensibilidad a las drogas. Úlcera gastrointestinal. Predisposición a retención urinaria. Acidosis. Embarazo. Lactancia. Asma. Diabetes.

## CONSERVACION

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

## PRESENTACION

Caja conteniendo 1 frasco x 120 mL de jarabe.

Mantengase Fuera Del Alcance De Los Niños  
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13