

# MENTOVICK 12 hs

Pseudoefedrina - Paracetamol  
Clorfeniramina

Comprimidos Revestidos

Vía de administración: Oral

## FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Paracetamol.....	500 mg
Pseudoefedrina HCl.....	120 mg
Clorfeniramina Maleato.....	4 mg
Excipientes.....	c.s

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

**Paracetamol:** Produce la antipirexia actuando a nivel central sobre el hipotálamo regulador de la temperatura para producir una vasodilatación periférica que da lugar a un aumento del flujo de sangre en la piel, de sudoración y pérdida de calor. La acción a nivel central probablemente está relacionada con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. Su acción analgésica ejerce inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel del S.N.C. y en menor grado bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Se absorbe rápida y completamente tras la administración oral, su unión a proteínas es variable. Se metaboliza en el hígado aproximadamente 90 a 95% de la dosis. Su eliminación es renal.

**Pseudoefedrina HCl:** Actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos en la mucosa del tracto respiratorio produciendo vasoconstricción. Reduce la hiperemia tisular, el edema, la congestión nasal, contrae las membranas mucosas nasales inflamadas y desobstruye las vías respiratorias nasales. Se metaboliza de modo incompleto en el hígado, su eliminación es por vía renal.

**Clorfeniramina Maleato:** Actúa compitiendo por los receptores H1 en las células efectoras; de esta manera evita pero no revierte, las respuestas mediadas únicamente por la Histamina. No bloquea la liberación de Histamina, pero antagoniza en diversos grados la mayoría de los efectos farmacológicos de la Histamina. Su acción anticolinérgica produce un efecto secante sobre la mucosa nasal. Se absorbe bien tras la administración oral, se metaboliza en el hígado y su eliminación es por vía renal.

## INDICACIONES

Descongestivo de las vías respiratorias, en los estados gripales, resfriado común, rinitis alérgica estacional, sinusitis alérgico-infecciosa y dolores de cabeza producidos en estos estados. Alivio sintomático de los procesos catarrales y gripales que cursen con fiebre, dolor leve o moderado y secreción nasal.

## POSOLOGÍA

Un comprimido cada 12 horas.

**Pacientes de edad avanzada:** Por el contenido en Pseudoefedrina y Clorfeniramina debe evaluarse la administración a estos pacientes les puede afectar especialmente en situaciones de bradicardia y de reducción del caudal cardiaco. Se debe controlar la tensión arterial especialmente en pacientes mayores con enfermedades cardiacas.

**Pacientes con insuficiencia hepática y renal:** antes de tomar este medicamento consultar a su médico.

**Población pediátrica:** Este medicamento está contraindicado en menores de 12 años.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes de la formulación. Insuficiencia hepática grave, disfunción renal grave y predisposición a retención urinaria. No se aconseja su asociación con depresores del SNC (como Benzodiazepinas, barbitúricos y/o bebidas alcohólicas. Hipertensión arterial severa. Pacientes tratados con antidepressivos tipo IMAO. Embarazo. Lactancia. Hipertiroidismo. Hipertrofia prostática.

## REACCIONES ADVERSAS

Con menor frecuencia: arritmia o hipertensión. Ocasionalmente: náuseas, vómitos,

sequedad bucal, diarrea y dolor abdominal. En forma leve puede presentarse cansancio, somnolencia, mareos, cefalea, hipotensión, visión borrosa; rara vez retención de orina y dermatitis alérgica (rash, urticaria o prurito).

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe tener cuidado al administrar a pacientes con insuficiencia hepática y/o renal. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Paracetamol, Pseudoefedrina con Clorfeniramina Maleato puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física requerida para la realización de actividades potencialmente peligrosas, como la conducción de vehículos o el manejo de máquinas. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia, o hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.

## INTERACCIONES

-El uso simultáneo del Paracetamol con otros antiinflamatorios puede potenciar los efectos terapéuticos pero también los tóxicos.

-El uso prolongado del Paracetamol con los salicilatos aumenta significativamente el riesgo de aparición de nefropatía o enfermedad renal terminal.

-La administración de Pseudoefedrina HCl antes o poco después de la anestesia con Clorofoma, Ciclopropano o Halotano puede aumentar el riesgo de arritmias ventriculares severas.

-Los IMAO pueden prolongar e intensificar los efectos vasopresores y estimulantes cardiacos de la Pseudoefedrina HCl. Mientras que prolonga los efectos depresores de la Clorfeniramina Maleato.

-El alcohol, los antidepressivos tricíclicos y los depresores del S.N.C. pueden potenciar los efectos depresores de la Clorfeniramina Maleato.

## SOBREDOSIS

Molestias gastrointestinales (calambres o dolor de estómago, vómito y diarrea). Aumento de la sudoración y hepatotoxicidad. Convulsiones, aumento de la presión arterial y agitación al respirar. Somnolencia intensa. Arritmias cardiacas.

## TRATAMIENTO

-Lavado gástrico.

-Oxígeno.

-Diazepam por vía intravenosa para las crisis convulsivas.

-La diuresis debe forzarse siempre y cuando la función renal sea adecuada.

-Se debe monitorizar el estado cardiaco y medir los electrolitos en suero.

-Administrar "acetilcisteína" antidoto usado como protector frente a la hepatotoxicidad.

## CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

## PRESENTACIÓN

Exhibidor conteniendo 50 blisters x 2 comprimidos revestidos.

Blister suelto x 2 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los Niños  
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de INDUFAR CISA  
Planta Industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13