

NEURO-VINIL

Diclofenac Potásico - Dexametasona
Cianocobalamina

Comprimidos Gastroprotegidos

Antiinflamatorio - Analgésico - Antineurítico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido gastroprotegido contiene:

Diclofenac potásico.....	50 mg
Dexametasona.....	0,5 mg
Cianocobalamina.....	2.500 mcg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

NEURO-VINIL, posee en su fórmula el **Diclofenac**, que es un potente antiinflamatorio no esteroide, sintético, moderno y eficaz procedente del grupo de los Arilalcanoicos. NEURO-VINIL es revelado como fármaco de elección para aliviar el dolor correspondiente a las estructuras somáticas, en especial al debido a los procesos reumáticos. Es reconocida, además, su actividad antiflogística en los procesos reumáticos crónicos, en los que no solamente calma el dolor, sino también disminuye la tumefacción y rigidez articular.

En la fórmula está también presente la **Dexametasona**, el antiinflamatorio esteroide más utilizado en el mundo para tratamientos prolongados.

Por último, tenemos la **Cianocobalamina**, de potente acción antineurítica, neurotrófica y analgésica.

INDICACIONES

NEURO-VINIL está indicado preferentemente en el tratamiento de las afecciones reumáticas articulares y extraarticulares agudas y crónicas de cualquier localización y periodo evolutivo, en los que el síntoma dolor y el proceso inflamatorio constituyen los elementos más destacados. Artritis y poliartritis, Artritis reumatoidea, Espondiloartritis anquilopoyética, Artrosis, Espondiloartrosis, Miositis, Bursitis, Tenosinovitis, Fibrositis, Torticolis, Lumbago, Lumbociatgía, Periartritis escapulo-humeral y de cadera, Compresiones radiculares, Cervicobraquialgias, Discopatías, Neuralgias, Algias rebeldes, Traumatismo, Esguinces, etc.

POSOLOGÍA

Dosis de ataque: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis de mantenimiento: 1 comprimido 1 a 2 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Leucopenia, tuberculosis. activa, úlcera péptica, herpes simple oftálmico, diabetes grave, psicosis aguda, hipersensibilidad a los principios activos, osteoporosis, embarazo y lactancia. No administrar conjuntamente con anti-coagulantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe administrarse con precaución y bajo estricto control médico en pacientes con afecciones cardíacas y renales, en casos de daño hepático y cuando existan procesos infecciosos. En tratamiento prolongado se aconseja el control de la fórmula hemática y el balance electrolítico, aún después de finalizada la administración del preparado.

REACCIONES ADVERSAS

Con la posología recomendada no se observan. Ocasionalmente en pacientes sensibles pueden aparecer síntomas de irritación gástrica.

INTERACCIONES

Administrado en forma simultánea con preparados de litio o digoxina, puede elevar el nivel plasmático de éstos. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. El peligro de hemorragias aumenta durante el empleo combinado de **Diclofenac** y anticoagulantes. Puede aumentar la concentración sanguínea del Metotrexato y elevar su toxicidad. La nefrotoxicidad de la Ciclosporina puede ser mayor mediante los efectos antiinflamatorios no esteroideos del **Diclofenac** sobre las prostaglandinas renales.

SOBREDOSIS

- Disturbios de S.N.C. (Vértigo, cefalea, hipertensión).
- Náuseas y vómitos.
- Dolor abdominal.
- Sangrado.

TRATAMIENTO

- Lavado gástrico y tratamiento con carbón activado.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio en pacientes con trastornos hemorrágicos, hipertensión, pacientes a quienes el ácido acetilsalicílico y otros agentes inhibidores de la prostaglandina sintetasa desencadenen ataques de asma, urticaria o rinitis aguda.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 25°C.

PRESENTACIÓN

Cajas conteniendo 20 comprimidos gastroprotegidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de **INDUFAR CISA**
Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535