

NORTENOL

Diltiazem 60 mg

Comprimidos ranurados

Vasodilatador coronario

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido ranurado contiene:

Diltiazem HCl..... 60 mg

Excipientes: Lactosa 293 mg; Alcohol etílico 0,07 mL; Otros Excipientes c.s

ACCIÓN TERAPÉUTICA

El NORTENOL es un medicamento destinado al tratamiento de la insuficiencia coronaria y la hipertensión arterial.

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de angina estable, angina inestable, angina de Prinzmetal. Cardiopatía isquémica. Hipertensión arterial. Insuficiencia coronaria. Infarto de miocardio. Episodios agudos de taquicardias supra-ventriculares o paroxísticas. Fibrilación o aleteo auricular.

POSOLOGÍA

Las dosis deben ser ajustadas a las necesidades de cada paciente. La dosis diaria habitual varía entre 180 y 360 mg, divididos en 3 tomas iguales, es decir, 60 a 120 mg, cada 8 horas.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas frecuentes son: rash cutáneo, prurito con o sin erupción cutánea trastornos digestivos poco importantes, astenia, somnolencia y cefaleas. Cuando se emplean las dosis más elevadas pueden aparecer edemas maleolares o de las extremidades inferiores, bradicardia, bloqueo A-V e hipotensión. Las reacciones adversas poco frecuentes son: insomnio, alucinaciones, depresión, taquicardia, anorexia, diarrea, boca seca, disgeusia, petequias, fotosensibilidad, hiperplucemia o congestión nasal. Elevaciones moderadas de los parámetros de función hepática (transaminasas, fosfatasa alcalina, LDH, Bilirrubina). Se recomienda monitorizar las funciones hepáticas periódicamente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se aconseja precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal avanzada. Este preparado puede ser asociado sin inconvenientes a nitratos. La asociación de **Diltiazem** con Digoxina puede producir un aumento de la concentración plasmática de los digitálicos. La asociación con betabloqueantes, antihipertensivos o Amiodarona debe ser efectuada con precaución pues puede determinar efectos aditivos. También es posible la asociación sin problema alguno a anticoagulantes, antiidiabéticos y antilipídémicos. Hipotensión. Insuficiencia cardiaca congestiva.

Este medicamento contiene como excipiente 0,29 g de Lactosa por cada comprimido ranurado lo que debe ser tomado en cuenta en pacientes con problemas de absorción de glucosa o galactosa, galactosemia o insuficiencia de lactosa. También contiene como excipiente Alcohol etílico 0,09 g lo que puede ser causa de riesgo en niños. No debe administrarse a niños, embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, epilepsia, alcoholismo

o pacientes con daños cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Puede disminuir la capacidad de reacción por lo que se aconseja precaución al conducir y manejar máquina peligrosa

INTERACCIONES

La administración conjunta de **Diltiazem** y Propanolol da como resultado un aumento de la concentración de Propanolol. El **Diltiazem** aumenta la concentración plasmática de Digoxina en 20%. La depresión de la contractilidad del miocardio, la automaticidad y la Dilatación vascular que se observan con el uso de anestésicos pueden agravarse al usar simultáneamente **Diltiazem**.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al **Diltiazem** o a alguno de los excipientes de la fórmula. Shock cardiogénico. Bloqueo AV grado II-III en pacientes sin marcapasos. Enfermedad del nódulo sinoauricular. Bradicardia severa debajo de los 40 latidos por minuto. Infarto agudo de miocardio y edema pulmonar. Insuficiencia ventricular izquierda con éstasis pulmonar. Embarazo. Lactancia.

SOBREDOSIS

Arritmia.
Distintos tipos y grados de bloqueo de conducción.
Alucinaciones.
Diarrea.
Cefaleas.
Náuseas.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Se deberá evaluar la relación riesgo-beneficio en casos de hipotensión (90 mmHg), infarto del miocardio y edema pulmonar. Embarazo y lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 comprimidos ranurados

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".

Importado por: IMFAR S.R.L.

Santa Cruz - Bolivia

Teléf. 362-6640

Regente: Dra. Ilibin Y. Ledezma C.

Matrícula Nº: L-165

Reg. Nº: II-38355/2015



**MEDICAMENTOS
CARDIOLÓGICOS**
División de INDUFAR CISA

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13