

# Oftalmol TDN

**Tobramicina 3 mg/mL**

**Dexametasona 0,05 mg/mL**

**Nafazolina 0,20 mg/mL**

Solución oftálmica estéril

Descongestivo - Antibiótico - Antiinflamatorio

Vía de Administración: Oftálmica

## FÓRMULA

Cada mL contiene:

Tobramicina.....	3 mg
Dexametasona (como fosfato sódico).....	0,05 mg
Nafazolina HCl.....	0,20 mg
Excipientes.....	c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Descongestivo, antibiótico y antiinflamatorio oftálmico.

## INDICACIONES

Tratamiento tópico de las infecciones externas del ojo y sus anexos causadas por bacterias susceptibles, caracterizadas por la inflamación de los tejidos.

## POSOLOGÍA

Instilar 1 o 2 gotas en los ojos afectados cada 2 a 3 horas.

## REACCIONES ADVERSAS

Pueden producirse en raros casos sensación de quemadura o picazón, así como también podrían aparecer midriasis, malestar, visión borrosa, queratitis punctata, lagrimeo, cefaleas, náuseas, sudoración, nerviosismo, alteraciones cardíacas, hiperglucemia.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Su uso prolongado puede derivar en una proliferación excesiva de microorganismos no susceptibles incluyendo hongos. Luego de su instilación, esperar 15 minutos para la colocación de lentes de contacto. Evitar la contaminación del pico gotero por contacto con el ojo o estructuras subyacentes.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a los componentes de la formulación.

## INTERACCIONES

El empleo concomitante con Naprolina o antidepresivos tricíclicos y **Nafazolina** puede potenciar el efecto presor de **Nafazolina**.

Los pacientes tratados con inhibidores de la MAO pueden experimentar una crisis hipertensiva severa si reciben un agente simpáticomimético.

## SOBREDOSIS

Irritación ocular, dolor leve a moderado.

## TRATAMIENTO

Tratamiento sintomático con lavados oculares con solución fisiológica y de persistir la irritación se aplicará un vasoconstrictor suave.

## RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio en pacientes con antecedentes de glaucoma, o infecciones oculares no tratadas de micosis, tuberculosis, virosis, adelgazamiento de córnea.

## CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura no mayor a 25°C. Una vez abierto el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 5 mL de solución oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta bajo receta

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**



**Oftalmol**

División de INDUFAR CISA

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13