

Oftalmol Tears

NAFAZOLINA - DEXTRAN 70 - HIPROMELOSA

Solución Oftálmica Estéril

Descongestivo y Lubricante Ocular

V.a.: Oftálmica

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Nafazolina HCl.....	0,12 mg
Dextran 70.....	1,00 mg
Hipromelosa.....	3,00 mg
Excipientes.....	c.s

ACCIÓN TERAPÉUTICA

La **Nafazolina** es una amina simpaticomimética de acción directa. Actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos de las arteriolas de la conjuntiva y produce vasoconstricción, de la que se deriva la disminución de la congestión conjuntival. El comienzo de la acción es en 10 minutos y su duración de 2 a 6 horas.

INDICACIONES

Alivio temporal del enrojecimiento del ojo debido a irritaciones oculares menores. Está indicado en todas las condiciones en que se desee un alivio de la irritación, ardor, prurito y/o congestión ocular, por ejemplo: polvo, humo, smog, exposición solar, viento, lentes de contacto, alergias, resfríos o natación. Por su contenido en **Hipromelosa** y **Dextran 70**, el medicamento es útil en los casos en que la irritación ocular es acompañada de déficit en la producción de lágrimas, proporcionando una confortable lubricación ocular

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Dosis usual: instilar 1 a 2 gotas en el (los) ojo (s) afectado (s) 3 a 4 veces al día, o con menor frecuencia, de acuerdo a como se presentan los síntomas. El tratamiento no debe superar los 4 días salvo indicación médica. Retirar los lentes de contacto antes de su uso.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho y con antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

REACCIONES ADVERSAS

Rara vez se presentan efectos secundarios/adversos graves. Sin embargo, la dosificación excesiva y/o el uso prolongado pueden aumentar la irritación de la conjuntiva y los efectos secundarios sistémicos tales como; mareos, dolor de cabeza,

aumento de la sudoración, náuseas, nerviosismo, debilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La **Nafazolina** debe utilizarse con precaución durante el embarazo, la lactancia, en niños menores de 2 años, y en pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión e hipertiroidismo.

INTERACCIONES

Los pacientes que se encuentran bajo tratamiento con inhibidores de la MAO pueden experimentar una crisis de hipertensión si se les administra una droga simpaticomimética.

SOBREDOSIS

Los síntomas de una sobredosis son: Disminución de la temperatura corporal, somnolencia, latidos cardiacos lentos, debilidad intensa.

TRATAMIENTO

El tratamiento es sintomático con lavados oculares con solución fisiológica, de persistir la irritación remitir de urgencia al especialista.

RESTRICCIONES DE USO

Glaucoma de ángulo estrecho o predisposición al mismo.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de solución oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



Oftalmol

División de **INDUFAR CISA**
Regente: Quim. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución:
Calle Anahí e/ Zavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

