

# Oftalmol

## Lágrimas

Fosfato disódico - Fosfato monosódico  
Polivinilpirrolidona - Cloruro de sodio

Solución Oftálmica Estéril

Humectante Ocular

Vía de Administración: Oftálmica

### FÓRMULA

Cada mL contiene:

Fosfato disódico anhidro.....	8,75 mg
Fosfato monosódico 2H <sub>2</sub> O.....	1,13 mg
Polivinilpirrolidona K30.....	15 mg
Cloruro de Sodio.....	4,20 mg
Excipientes.....	c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Humedece y lubrica el espacio entre el globo ocular y párpados, disminuyendo así el roce.

### INDICACIONES

Irritación y resecaimiento de los ojos, déficit de producción de lágrimas. En todos aquellos estados que requieren refuerzo lagrimal (lentes de contacto, edad avanzada, polución ambiental).

### POSOLOGÍA

Se recomienda instilar 1 a 3 gotas en cada ojo tantas veces como sea necesario.

**"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".**

### REACCIONES ADVERSAS

En casos aislados puede ocasionar irritación ocular por hipersensibilidad. Ocasionalmente visión borrosa, molestias.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Para prevenir la contaminación del producto, debe cuidarse de no tocar los párpados, pestañas y zonas anexas con el pico del frasco gotero. Mantener el frasco gotero cuidadosamente cerrado.

"Si luego de varios días del uso persistiera la irritación se recomienda consultar al oftalmólogo."

### INTERACCIONES

No presenta interacciones con fármacos y/o alimentos.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la

formulación.

### SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental se presentan náuseas, cólicos.

### TRATAMIENTO

- Lavado gástrico.
- Tratamiento sintomático y de mantenimiento.

### RESTRICCIONES DE USO

Embarazo: Solo debe utilizarse en el embarazo si el beneficio justifica el riesgo potencial para el feto.

Lactancia: No se ha establecido si son excretados en la leche humana, se debe actuar con precaución cuando es administrado a una mujer que amamanta.

### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° a 30° C.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

### Paraguay:

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**

Importado por: **IMFAR S.R.L.**  
Santa Cruz - Bolivia  
Teléfono 362-6640  
Regente:  
Dra. Iblin Y. Ledezma Castro  
Matrícula N°: L-165  
Reg. N°: II-35313/2014

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13



**Oftalmol**

División de INDUFAR CISA

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535