

Oftalmol

Fluoro-Tetrazolina

Suspensión oftálmica estéril

Antiinflamatorio y descongestivo oftálmico

Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL contiene

Fluorometolona.....1 mg

Tetrahidrozolina HCl.....0,25 mg

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

OFTALMOL FLUORO- TETRAZOLINA es un antiinflamatorio y descongestivo oftálmico cuya acción terapéutica se debe a la **Fluorometolona**, glucocorticoide 40 veces más eficaz que la Hidrocortisona, y la **Tetrahidrozolina**, simpaticomimético de acción vasoconstrictora local.

INDICACIONES

Está indicado en el tratamiento de la inflamación post-operatorio tras la cirugía ocular. Tratamiento de la Uveítis anterior, Tratamiento de las enfermedades alérgicas e inflamatorias de naturaleza no infecciosas de la conjuntiva palpebral y bulbar, de la córnea y del segmento anterior ocular que respondan a los corticosteroides. Conjuntivitis no infecciosas alérgicas agudas, lesiones de la córnea, ciclitis, queratitis. Post-operatorio de estrabismo, catarata y glaucoma con tratamiento antimicrobiano suplementario.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Salvo mejor criterio médico, se aconseja instilar en la fase aguda 1 a 2 gotas en el fondo del saco conjuntival cada 3 a 4 horas. En el empleo permanente, 1 gota 2 a 3 veces al día. Administrar con precaución a niños menores de 2 años. Agitar bien antes de usarlo.

REACCIONES ADVERSAS

Más frecuentemente puede ocurrir: visión levemente borrosa temporal. Menos frecuentemente quemazón, escozor, enrojecimiento o lagrimeo de los ojos. Muy raramente glaucoma, hipertensión ocular, lesión del nervio óptico o defectos de la agudeza y del campo visual, adelgazamiento de la córnea y/o perforación del globo ocular, infección ocular secundaria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda controlar la presión intraocular en tratamientos prolongados. Pacientes embarazadas. Por el contenido en **Fluorometolona**, suspender el amamantamiento al administrar a mujeres lactantes. Niños menores de 2 años.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la **Fluorometolona** y la **Tetrahidrozolina**. Este medicamento no debe usarse cuando existan los siguientes problemas:

Enfermedades fúngicas oculares o queratitis superficial aguda producida por herpes simple o tuberculosis ocular, activa o antecedentes de enfermedad viral aguda infecciosa. Glaucoma de ángulo estrecho. Infecciones purulentas agudas no tratadas las cuales, al igual que otras enfermedades causadas por microorganismos, pueden quedar enmascarados o agravarse por la presencia de esteroide, ojo rojo, cuando el diagnóstico no haya sido confirmado; infecciones amebianas.

INTERACCIONES

Las asociaciones que contengan cualquiera de los siguientes medicamentos, dependiendo de la cantidad presente, pueden también interactuar con esta medicación: antiglaucomatosos, anticolinérgicos especialmente la Atropina y compuestos relacionados. El uso de lentes de contacto pues aumentan el riesgo de infección.

SOBREDOSIS

Generalmente, la sobredosis por **Fluorometolona** en preparaciones oftálmicas no da lugar a efectos adversos graves. La sobredosificación por **Tetrahidrozolina** puede causar midriasis, cianosis, temperatura elevada.

TRATAMIENTO

El tratamiento principal es la dilución por aplicación a los ojos de agua potable tibia.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C. Una vez abierto el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de suspensión oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Oftalmol

División de INDUFAR CISA

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13