

Oftalmol A+T

Antazolina - Tetrazolina

Solución Oftálmica Estéril Descongestivo

Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Antazolina Fosfato.....	0,5 mg
Tetrazolina HCl.....	0,4 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

La **Antazolina** es un antihistamínico que actúa bloqueando de forma competitiva los receptores H1 de las células efectoras, y en consecuencia disminuyendo los efectos que ejerce la histamina liberada en el tejido, como aumento de la permeabilidad, dilatación de los capilares, contracción de la musculatura lisa, edema, picor y lagrimeo.

La **Tetrazolina** es un vasoconstrictor y descongestivo estrechamente emparentado con la Nafazolina. Produce estimulación alfa-adrenérgica causando constricción de las arteriolas conjuntivales y por consiguiente reduce la irritación inflamatoria y la tumefacción de la conjuntiva. Puede provocar una ligera reducción de la presión intraocular.

INDICACIONES

Afecciones alérgico inflamatorias de la conjuntiva. Conjuntivitis flictenular. Conjuntivitis irritativas no infecciosas. Además, en casos de reacciones de hipersensibilidad medicamentosa, secreción lagrimal excesiva y estenosis del conducto lagrimal.

POSOLOGÍA

Salvo otra indicación del facultativo, la dosis recomendada para adultos es instilar 1 gota de OFTALMOL A+T en cada ojo afectado, cada tres horas durante la fase aguda. Para el tratamiento de mantenimiento es suficiente la administración de 1 gota, 2-3 veces al día.

En niños de 2-12 años: 1-2 gotas al día.

CONTRAINDICACIONES

Personas alérgicas a cualquiera de las drogas que contiene este producto. Embarazo. Lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente puede producir escozor leve y transitorio inmediatamente después de la instilación del colirio. Puede producirse una hiperemia reactiva tras suspender el producto. En raros casos pueden aparecer cefaleas, somnolencia y taquicardia, sobre todo en niños pequeños, así como sudoración, temblor, elevación de la presión arterial, estimulación central y síntomas anginosos

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En pacientes con alergia recurrente crónica se deben elegir otras medidas terapéuticas u otros medicamentos. No está previsto el

uso de este producto a largo plazo.

Hay que tener precaución en los pacientes con rinitis seca. Debido a los efectos simpaticomiméticos generales, se debe tener cuidado al utilizar el producto en pacientes con diabetes o con cardiopatía grave, hipertensión, hipertiroidismo o feocromocitoma.

Las infecciones oculares pueden verse enmascaradas.

Para usuarios de lentes de contacto: Antes de aplicar el producto se deben quitar los lentes de contacto, y no se volverán a colocar al menos hasta 15 minutos después de la aplicación.

INTERACCIONES

Debido a que OFTALMOL A+T contiene dentro de su formulación **Tetrazolina**, no debe emplearse en pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) hasta diez días después de concluir el tratamiento. Se produce un aumento de la tensión arterial con el uso concomitante con IMAO y antidepresivos tricíclicos.

SOBREDOSIS

No existe información disponible en cuanto a la sobredosis en humanos.

TRATAMIENTO

El tratamiento en una sobredosis accidental oral incluye terapia de soporte y sintomática. Se deben mantener despejadas las vías respiratorias. Ingerir abundante líquido.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo. Lactancia. Niños menores de 2 años.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a una temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C. Una vez abierto el frasco utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de solución oftálmica.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.



Oftalmol

División de INDUFAR CISA

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13