

Odontol Biotic

Amoxicilina - Diclofenac

Comprimidos Revestidos

Antibiótico - Antiinflamatorio - Analgésico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....	500 mg
Diclofenac potásico.....	50 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ODONTOL BIOTIC, es la asociación de un antibiótico bactericida **Amoxicilina** y un potente antiinflamatorio **Diclofenac**.

La presencia del antibiótico asegura la supresión de cualquier proceso infeccioso o séptico, donde están presentes gérmenes sensibles, tales como: Staphylococcus aureus y albus, estreptococo, neumococo, proteus, shigellas, gonococo, Escherichia coli, etc.

El **Diclofenac**, completa la acción terapéutica, suprimiendo el proceso inflamatorio y doloroso que acompaña casi siempre a un proceso infeccioso.

INDICACIONES

ODONTOLOGÍA: Pulpitis, alveolitis, abscesos, granulomas, quistes. En tratamiento pre y post-quirúrgicos, gingivitis, estomatitis, periodontitis.

POSOLOGÍA

1 comprimido revestido cada 8 horas, salvo mejor criterio del profesional.

CONTRAINDICACIONES

Úlcera gastroduodenal, hipersensibilidad comprobada a las penicilinas.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden presentarse reacciones gastrointestinales como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea. En raras ocasiones pueden encontrarse rash o erupción cutánea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe administrarse con cuidado en casos de pacientes alcohólicos. Se deberá tener especial precaución al administrar a pacientes de edad avanzada.

Puede producir inflamación, irritación o ulceración de la mucosa oral. Tener precaución en pacientes geriátricos en los que puede ser más probable que se desarrollen efectos renales, hepáticos o gastrointestinales severos.

INTERACCIONES

El Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfamidas o Tetraciclinas pueden

interferir en los efectos bactericidas de la **Amoxicilina**.

La **Amoxicilina** puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos.

Aumenta significativamente el riesgo de aparición de nefropatía con el uso simultáneo y prolongado de Ácido Acetilsalicílico.

Administrando el **Diclofenac** en forma simultánea con preparados de Lito o Digoxina, puede elevar el nivel plasmático de éstos.

El **Diclofenac** puede inhibir el efecto de los diuréticos.

SOBREDOSIS

-Calambres y dolores fuertes en el abdomen o estómago.

-Diarrea sanguinolenta

-Náuseas

-Caída de la Presión Sanguínea

-Sudoración

-Arritmias cardíacas

TRATAMIENTO

-El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento

-Reposición de líquidos, electrolitos y proteínas

-Evitar la administración de antiálgicos, antiparasitarios ya que puede lograr y/o empeorar la diarrea.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo beneficio al administrar a pacientes con afecciones hepáticas, cardíacas o renales graves, trastornos hematopoyéticos.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

Caja x 8 comprimidos revestidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta Simple Archivada.

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13