

Odontol Gesic

Diclofenac - Metamizol

Comprimidos revestidos

Antiinflamatorio - Analgésico

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido revestido contiene:

| | |
|--------------------------|--------|
| Diclofenac potásico..... | 50 mg |
| Metamizol..... | 500 mg |
| Excipientes..... | c.s. |

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ODONTOL GESIC comprimidos revestidos, contiene en su fórmula un antiinflamatorio, el **Diclofenac potásico**, derivado del Acido Arilalcanoico y un analgésico - antipirético, el **Metamizol** derivado pirazolónico. Su campo de aplicación está orientado a combatir todos los procesos dolorosos acompañados de inflamación y fiebre, donde los síntomas resaltantes son el edema, tumefacción, calor y dolor, que desaparecen por efecto de la administración de ésta asociación.

INDICACIONES

Sus indicaciones principales por lo tanto son: procesos inflamatorios de la esfera bucal: odontalgias, procesos dolorosos post-extracción para un efecto analgésico rápido y combatir el proceso inflamatorio agregado. Odontitis, periodontitis, hipersensibilidad de la dentina, gingivitis, paradentosis.

POSOLOGIA

Se recomienda 1 comprimido cada 6 a 8 horas, según criterio médico e intensidad del dolor. Máximo: 4 comprimidos por día ingeridos preferentemente antes de las comidas.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más comunes son las gastrointestinales como dolor epigástrico, náuseas, vómitos y diarrea. Raras veces pueden aparecer trastornos hipogástricos, mareos, rash o erupción cutánea, y alteraciones urinarias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Los pacientes con trastornos gastrointestinales o antecedentes de úlcera péptica deberán mantenerse bajo estricto control médico durante la administración de Odontol Gesic. Con la administración del **Metamizol** presente en la formulación los pacientes que padecen asma bronquial o afecciones crónicas de las vías respiratorias, están expuestos a posibles reacciones anafilactoideas.

CONTRAINDICACIONES

Tener precaución en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal.

INTERACCIONES

El **Metamizol** puede reducir la acción de la Ciclosporina, y se potencian los efectos con la ingestión simultánea de alcohol.

Administrando el **Diclofenac** en forma simultánea con preparados de Lito o Digoxina, puede elevar el nivel plasmático de éstos.

El **Diclofenac** puede inhibir el efecto de los diuréticos.

La nefrotoxicidad de la Ciclosporina puede ser mayor mediante los efectos antiinflamatorios no esteroides del **Diclofenac** sobre las prostaglandinas renales.

SOBREDOSIS

- Dolor abdominal.
- Caída de la presión sanguínea.
- Arritmias cardíacas.
- Mareos, somnolencia, convulsiones.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

El metabolito principal (4 - N - metilaminoantipirina) puede ser eliminado por hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión o filtración plasmática.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes con trastornos hematopoyéticos, pacientes en los que el Acido Acetil Salicílico desencadene ataques de asma, urticaria o rinitis aguda.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES

Caja x 10 comprimidos revestidos.
Exhibidor x 100 comprimidos revestidos.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en las calles Gral. Santos c/ Manuel Domínguez. Teléfono: 202-113".



División de **INDUFAR CISA**
Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución:
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13