

Odontol

VERDE *Menta y Fluor*

Antiinflamatorio, ideal contra la gingivitis

Antiinflamatorio - Analgésico

Líquido enjuagatorio

Vía de administración: Tópica Bucal

FÓRMULA

Cada 120 mL contiene:

Bencidamina Clorhidrato.....180 mg

Fluoruro de sodio.....12 mg

Excipientes:

Glicerina Anhidra 6 g; Sacarina sódica 36 mg; Esencia menta Piperita 48 mg; Color Amarillo FDC N° 5 Tartrazina 0,56 mg; Alcohol Etilico 12 mL; Otros Excipientes.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Posee en su fórmula la Bencidamina que tiene acción analgésica y antiinflamatoria, también por vía tópica. Esta acción se manifiesta en todos los procesos dolorosos con Inflamación, además de poseer localmente acción anestésica útil. El Fluor (bajo la forma de Fluoruro de sodio) es primordial para la prevención de caries, especialmente en los dientes en formación por aumentar la consistencia de la capa externa del esmalte dentario.

INDICACIONES

Afecciones odontoestomatológicas: gingivitis, glositis, estomatitis, aftas, parodontosis, tratamiento colateral de la terapia dental conservadora y extractiva. Otorrinolaringología: Angina, amigdalitis, faringitis, laringitis, profilaxis de las caries dentales.

CONTRAINDICACIONES

Úlcera gastroduodenal activa. Hemorragia digestiva. Intolerancia o antecedentes de hipersensibilidad a los antiinflamatorios indólicos o indazólicos. Fluorosis dental o prevalencia en otros miembros de la población inmediata.

POSOLOGÍA

Llene la tapa del envase (13 mL) y realizar buches hasta 3 veces al día, manteniendo el colutorio en la boca por 1 minuto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No enjuagarse la boca con agua en forma inmediata después de usar el medicamento. El cambio de gusto en la boca puede durar hasta 4 horas después de la administración de una dosis. Se puede producir aumento del sarro. Este medicamento contiene Glicerina Anhidra como excipiente pudiendo ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Por contener como excipiente Color Amarillo FDC N° 5 Tartrazina puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos del ácido acetilsalicílico. También contiene 15,2 g de Alcohol Etilico

como excipiente por cada 120 mL, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIÓN

Líquido enjuagatorio de 220 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".**



División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13